

Les papillomavirus sont à l'origine de plus de 3000 nouveaux cas de cancers de la gorge en France tous les ans. Les cancers de la gorge liés aux papillomavirus sont en forte augmentation dans le monde.

- ⇒ Les papillomavirus humains (HPV) sont des **virus très répandus et contagieux**, qui se transmettent par **contacts avec la peau ou les muqueuses** entre deux individus. Dans certains cas, le virus va rester au niveau de la peau ou de la muqueuse et entraîner une lésion. Les lésions les plus fréquentes sont bénignes comme les **verrues plantaires**, ou beaucoup plus ennuyeuses comme les **verrues ano-génitales ou condylomes vénériens** (lésions au niveau des organes génitaux ou de l'anus)

**Hommes Femmes
tous concernés !**

**HPV
5% des cancers dans le
monde**

**6300 nouveaux
cas par an en France
1/3 chez les hommes**

- ⇒ Mais certaines lésions sont à l'origine de **tumeurs cancéreuses** (cancers de la gorge, du col de l'utérus, de la vulve, de l'anus, du pénis)

Le virus HPV peut être présent mais silencieux pendant plusieurs années dans l'organisme.
La contamination par ce virus est notamment liée à la **vie sexuelle active à l'âge adulte.**

Des solutions existent pour prévenir ces risques

La meilleure façon de s'en prémunir est de **se faire vacciner avant les premiers rapports sexuels.**

1- Je fais vacciner mes enfants (garçons et filles) dès 11 ans contre le HPV

**à l'âge de 11 ans
pour les garçons et les filles**

- **2 injections** espacées de 6 à 13 mois
- possible jusqu'à l'âge de 14 ans.

**A partir de 15 ans
et jusqu'à 19 ans révolus**

- **3 injections**
- la 2^{ème} injection a lieu 1 mois après la 1^{ère} et la 3^{ème} est réalisée 6 mois après la 1^{ère}

Ce schéma vaccinal actuellement recommandé est remboursé par l'assurance maladie et par certaines mutuelles.

2- Je consulte en cas de gêne à la gorge et/ou en présence d'un ganglion dans le cou depuis plus de 3 semaines

En l'absence de vaccination, il faudra être vigilant et consulter un ORL en cas de symptômes pouvant correspondre à un cancer de la gorge induit par HPV.

Ces cancers peuvent se manifester par une gêne ou une douleur dans la gorge /ou par un ou des ganglions dans le cou qui persistent plus longtemps que lors des infections ORL habituelles comme les rhinopharyngites et les angines. Ces cancers sont rarement très douloureux, ce qui peut rassurer à tort. Le ganglion dans le cou peut même prendre l'aspect d'un kyste banal.

Le vaccin actuellement recommandé prévient les infections contre les principaux virus HPV et ainsi prévient efficacement l'apparition des lésions précancéreuses et les cancers du col de l'utérus. Il limite aussi les infections HPV au niveau de la gorge.

Pour plus d'informations

<https://vaccination-info-service.fr/Les-maladies-et-leurs-vaccins/Infections-a-Papillomavirus-humains-HPV>