



QUE FAIRE PAR RAPPORT A VOS TRAITEMENTS MEDICAMENTEUX HABITUELS AVANT DE PASSER UNE SCINTIGRAPHIE DU MYOCARDE ?

Madame, Monsieur,

Vous venez d'être convoqué pour la réalisation d'un examen pouvant nécessiter l'arrêt de certains de vos médicaments.

Nous vous demandons de bien vouloir prendre contact auprès de votre médecin ayant prescrit l'examen afin d'adapter vos traitements. Vous trouverez ci-après quelques recommandations à son intention.

En cas de douleurs thoraciques, reprenez votre traitement et consultez rapidement votre médecin traitant.

Le jour de l'examen, nous vous demandons également de vous munir de votre ordonnance de traitement habituel et de l'ordonnance pour la réalisation de la scintigraphie myocardique.

La veille au soir depuis 20h : ne pas consommer de thé, café, chicoré (Ricoré®), chocolat, banane, de cola et de fruits secs.

Le jour de l'examen, vous ne devez pas être à jeun. SEULS SONT AUTORISES UN VERRE D'EAU PLATE (sans gaz, sans sirop) ET DES BISCOTTES BEURREES. Aucun autre liquide ou solide n'est autorisé.

La non application de ces recommandations pourra conduire à l'annulation de votre examen qui se révélerait ininterprétable.

Certains médicaments doivent être **arrêtés 12H ou 48H** avant l'heure ou le jour de réalisation de la scintigraphie.

En cas d'interrogation relative à votre traitement, veuillez contacter votre médecin traitant ou votre cardiologue.

ARRÊT 48 HEURES AVANT LE JOUR DE RÉALISATION DE LA SCINTIGRAPHIE (exemple : scintigraphie le mercredi, arrêt du traitement le lundi)			
ACEBUTOLOL	DILTIAZEM	MANIDIPINE	SELOZOK
AMLODIPINE	DINITRATE D'ISOSORBIDE	METOPROLOL	SEVIKAR
AMLOR	DISCOTRINE	MODUCREN	SOTALEX
ARTEX	EPINITRIL	MOLSIDOMINE	SOTALOL
ATENOLOL	EXFORGE	MONOTILDIEM	TARKA
AXELER	FELODIPINE	NADOLOL	TEMERIT
BETATOP	FLODIL	NATISPRAY	TEMERITDUO
BETAXOLOL	ICAZ	NATRIXAM	TENORETIC
BISOCE	IKOREL	NEBILOX	TENORMINE
BISOPROLOL	IPERTEN	NEBIVOLOL	TILDIEM
BITILDIEM	ISOCARD	NICARDIPINE	TIMACOR
CADUET	ISOPTINE	NICORANDIL	TIMOLOL
CARDENSIEL	IVABRADINE	NIFEDIPINE	TRANDATE
CARVEDILOL	KREDEX	NIMOTOP	TRIMETAZIDINE
CELECTOL	KERLONE	NITRENDIPINE	TRINIPATCH
CELIPROLOL	LERCAN	NITRIDERM	TRINITRINE
CONEBILOX	LERCANIDIPINE	PROCORALAN	VASTAREL
CORGARD	LERCAPRESS	PROPRANOLOL	VERAPAMIL
CORVASAL	LODOZ	RECTOGESIC	VISKEN
COSIMPREL	LOGIMAX	RISORDAN	WYTENS
COVERAM	LOPRESSOR	SECTRAL	ZANEXTRA
DETSIEL	LOXEN	SELOKEN	ZANIDIP

ARRÊT 12 HEURES AVANT L'HEURE DE RÉALISATION DE LA SCINTIGRAPHIE			
ALEPSAL	ASPRO CAFEINE	CAFEINE	CEFALINE
CLARADOL CAFEINE	GURONSAN	LAMALINE	

Les traitements sont à reprendre après la réalisation de l'examen.

