

TRAITEMENT ANTIBIOTIQUE PRÉSUMPTIF D'UNE DIARRHÉE SÉVÈRE

☛ SI RECOURS MÉDICAL RAPIDE IMPOSSIBLE POUR DIAGNOSTIC +++

Définition DIARRHÉE SÉVÈRE :

- Diarrhée **fébrile** avec **glaires et/ou sang** ou couleur « **jus de melon** »
ET / OU
- Diarrhée (fébrile ou non) rendant **totale**ment impossible les activités de vie courante malgré le recours à un traitement symptomatique anti-diarrhéique recommandé (exemples : racécadotril [TIORFAN®/TIORFANOR®] ou diosmectite [SMECTA®]).

Contre-indications et précautions d'emploi :
En l'absence de contre-indication(s) : dérivés ergot de seigle, CISAPRIDE, COLCHICINE, trouble du rythme ou de la conduction cardiaque (QT long) insuffisance cardiaque ou hépatique sévères. Déconseillés ou précautions d'emploi avec : statines, CICLOSPORINE, DIGOXINE, IVRABADINE, antivitamines K, médicaments facilitant les torsades de pointe (antiarythmiques type QUINIDINE, AMIODARONE, SOTALOL, antipsychotiques, antidépresseurs triclyclitiques, fluoroquinolones, médicaments hypokaliémants, bradycardisants ou allongeant le QT).

AZITHROMYCINE 250mg Comprimé

- ☐ **ADULTE : 4 comprimés à 250 mg en 1 seule et unique prise**
- ☐ **ENFANT > 25 Kg : 2 comprimés par jour (500 mg) en 1 prise pendant 3 jours**

AZITHROMYCINE 40mg/ml Buvable

- ☐ **ENFANT < 25 Kg**
- **Posologie selon le poids de l'enfant : 20 mg par kilogramme de poids en une prise par jour pendant 3 jours.**
- *Le pharmacien vous précisera la posologie selon le poids mais **par exemple**, la graduation 15 sur la seringue de la forme buvable correspond à la dose à administrer pour un enfant de 15 kg.*

REMARQUES :

- **Prendre le médicament avec un grand verre d'eau, à jeun ou au cours d'un repas (éviter lait/produit laitier).**
- Ecraser les comprimés si jeune enfant et forme buvable indisponible.
- **Penser à se réhydrater en buvant davantage.**
- **Chez l'enfant de petit poids, possibilité d'utiliser un soluté de réhydratation orale prêt à l'emploi (ex: FANOLYTE® ou ADIARIL®).**
- **Une consultation médicale rapide est nécessaire** dans tous les cas ; et indispensable en l'absence d'évolution favorable au bout des 2 jours (48 heures) suivant le début de l'azithromycine.