

Service de neurologie et maladies
inflammatoires du système nerveux
central

MON TRAITEMENT PAR
KESIMPTA®


Mon neurologue

Pr/Dr :

Secrétariat :

Mon service d'hospitalisation

Tél. :



KESIMPTA® (NOVARTIS) OFATUMUMAB

Présentation

L'Ofatumumab est un anticorps monoclonal humanisé qui va se fixer sur des récepteurs spécifiques (CD 20) présents sur certains globules blancs : les lymphocytes B.

Il induit la destruction des lymphocytes B ce qui permet d'avoir une réduction rapide de ces derniers. Les lymphocytes B vont se reproduire au bout de plusieurs mois d'où la nécessité d'un traitement au long cours. Il épargne les autres cellules : les lymphocytes T et NK, les polynucléaires, les globules rouges, les plaquettes...

Il va permettre :

- la diminution de la dégradation de la myéline,
- la diminution de l'inflammation et ralentissement de la progression de la maladie,
- la diminution du risque de poussée.

Indication

Les patients adultes atteints de forme active de sclérose en plaques : SEP-RR (rémittente-récurrente) ou SEP-SP (secondairement progressive) avec poussée.

Avant l'administration du traitement

- Bilan biologique (sang).
- Bilan radiologique (radiographie des poumons, panoramique dentaire et IRM cérébral).

IMPORTANT :

- Mise à jour des vaccinations : faire le point avec le neurologue et le médecin traitant.
- Contre indication des vaccins atténués (fièvre-jaune, ROR, varicelle) sous Ofatumumab.

Grossesse/allaitement

En cas de souhait de grossesse à venir, cela doit être discuté avec le neurologue. De même, la possibilité d'allaitement sous ce type de traitement doit être discutée avec le neurologue.

Les femmes en âge de procréer doivent utiliser une contraception appropriée.

Administration

Le Kesimpta® se présente sous forme de stylo auto injecteur pré rempli. Il est injecté par le patient lui-même en sous cutané.

La première injection se fait avec l'accompagnement d'un professionnel de santé.

Schéma posologique :

- **semaine 0** : première injection de 20 mg,
- **semaine 1 et Semaine 2** : injection de 20 mg,
- **semaine 3** : pas d'injection,
- **À partir de la semaine 4** : 1 injection (de 20 mg) mensuelle d'entretien.

SI OUBLI :

faire l'injection dès que possible puis tous les mois.

CONSERVATION : au réfrigérateur (entre 2°C et 8°C).
NE PAS CONGELER

Conserver dans son emballage à l'abri de la lumière.

IMPORTANT :

Sortir le stylo 15 à 30 minutes avant l'injection.



Effets indésirables

Généralement, le traitement est très bien toléré. Des effets secondaires sont cependant possibles :

Post injection (24h)

- Au niveau du site d'injection : œdème, rougeur, prurit (démangeaisons).
- Autres (surtout après la première injection) : fièvre, frissons, maux de tête. La prise de paracétamol peut être recommandée.

Sur le long terme

- Infections : voies respiratoires supérieures, infections urinaires, herpès buccal.
- Perturbation du bilan sanguin : diminution des immunoglobulines et des globules blancs.

Surveillance

Réalisation des bilans sanguins et IRM selon la prescription de votre neurologue.

EN CAS D'INFECTION ET DE FIÈVRE CONFIRMÉE: il est important de consulter votre médecin et de réaliser une biologie (NFS) en urgence.

Dépistage des cancers selon les recommandations (Absence de signe d'alerte particulier avec l'Ofatumumab à ce jour).