

Information générale sur mon médicament

Flacon de 100 comprimés blancs sécables en deux.

Ce médicament est soumis à une **prescription initiale hospitalière** par des médecins spécialistes et il n'est **disponible qu'à la pharmacie hospitalière** (rétrocession).

Comment ça marche ?

Il est indiqué dans le traitement du **carcinome corticosurrénalien**.

Il agit en détruisant les cellules de la glande surrénale diminuant ainsi la sécrétion des hormones responsables des symptômes de la maladie.

Comment dois-je prendre mon médicament ?

Le traitement est à prendre en **2 ou 3 prises par jour**.

Les comprimés doivent être avalés avec un verre d'eau au cours d'un repas riche en graisses.

Lavage de mains avant et après chaque prise.



Si traitement administré par une personne autre que le patient, porter des gants. Les comprimés abîmés ne doivent pas être utilisés.

Que dois-je faire en cas d'oubli ?

Ne prenez jamais une double dose pour rattraper une dose oubliée. Notez seulement la dose oubliée dans votre carnet de suivi et prenez la dose suivante normalement.

Conseil pour éviter les oublis :

- Utilisez une alarme (téléphone portable,...)
- Utilisez un pilulier
- Choisissez des horaires fixes **adaptées à votre mode de vie**. Cela vous aide à ne pas oublier de prises

Interaction médicamenteuse

Ne prenez pas un autre médicament sans interroger votre médecin ou votre pharmacien. (même ceux obtenus sans ordonnance).

Des médicaments peuvent interagir avec le Lysodren® (modification de son efficacité ou augmentation des effets indésirables).

Parmi les aliments et les plantes à éviter : le jus de pamplemousse et le millepertuis

Quelles sont les effets indésirables qui peuvent survenir ?

Troubles digestifs : nausées, vomissements, diarrhées, irritation gastrique

Mangez lentement, calmement, évitez les repas trop riches ou trop copieux. Si ces symptômes persistent, parlez-en à votre médecin.

Eruption cutanée

Utiliser un savon doux et éviter l'exposition au soleil en préventif. Une crème hydratante soulage les symptômes.

Troubles neurologiques : confusion, vertiges, somnolence, troubles de la coordination motrice

Surviennent généralement lorsque vous êtes surdosés en médicament, contactez le médecin.

Perturbations du bilan biologique : augmentation du cholestérol, des lipides, allongement du temps de saignement

Surveillance du bilan biologique

D'autres effets indésirables peuvent survenir.

N'hésitez pas à signaler tout effet indésirable à votre médecin ou pharmacien.

Conseils généraux



La conduite de véhicules ou de machines est interdite.



Ne pas jeter les comprimés dans votre poubelle. Rapportez-les à votre pharmacien en fin de traitement



Ne pas laisser à la portée des enfants.



Se **laver les mains** avant et après chaque manipulation des comprimés



Pensez à prendre avec vous votre traitement en quantité suffisante, ainsi que votre ordonnance originale pour un éventuel renouvellement, En cas de décalage horaire, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.



Une **contraception efficace** doit être poursuivie pendant le traitement. Il est également **interdit d'allaiter** sous Lysodren®.



Conservez les comprimés dans l'emballage d'origine à température ambiante (<30° C) à l'abri de l'humidité.

Surveillance biologique

Le Lysodren® est une molécule que l'on dose dans le sang (surtout en début de traitement et surtout chez les patients en surpoids et/ou ayant un problème aux reins ou au foie).

Contactez rapidement votre médecin en cas de :

- fatigue, douleurs abdominales, nausées, vomissements
- coloration sombre des urines, démangeaisons, jaunisse
- troubles de la coordination, de la motricité
- Traumatisme sévère, choc, infection

Commentaires :

Contacts :

LYSODREN® Mitotane



© Chu de Bordeaux - Images : AdobeStock, Fotolia, Freepik - Mars 2026