

## Existe-t'il des interactions médicamenteuses avec mon

Certains médicaments peuvent augmenter les effets indésirables de votre traitement ou diminuer son efficacité.

 Par conséquent, ne prenez aucun nouveau traitement (même sans ordonnance) sans avis médical.

Un intervalle de 2h est recommandé entre la prise de Abémaciclib VERZENIOS® et :

Les médicaments utilisés pour soulager les aigreurs d'estomac (Gaviscon® , Maalox® , Xolaam® , Phosphalugel® etc...)

Les médicaments contenant du charbon ou de l'argile utilisés pour soulager les ballonnements comme (carbolevure® , carbosylane® , Bedelix®)

**Le millepertuis et le pamplemousse sont contre-indiqués.**

Une surveillance périodique sera effectuée si vous êtes sous anticoagulants en raison du risque hémorragique.

 **Pensez à donner la liste complète des médicaments, plantes ou tisanes à votre médecin ou à votre pharmacien.**

## Que faire en cas de déplacement ou de voyage ?

Pensez à prendre avec vous votre traitement en quantité suffisante. Pensez également à prendre votre ordonnance originale pour un éventuel renouvellement. En cas de décalage horaire, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

## Que faire en cas d'intervention chirurgicale ?

Il faut absolument signaler que vous prenez Abémaciclib VERZENIOS® avant tout geste chirurgical ou de chirurgie dentaire (même une extraction dentaire).

## Recommandations générales



Se laver les mains avant et après chaque manipulation des comprimés.



De préférence, ramenez les boîtes d'Abémaciclib VERZENIOS® entamées et les emballages vides à votre pharmacie en fin de traitement.



Protégez-vous du soleil et évitez les expositions prolongées.



Une contraception efficace doit être poursuivie pendant la durée du traitement. Il sera conseillé de poursuivre une contraception au moins 1 mois après l'arrêt du traitement.



Le médicament doit être conservé dans sa boîte d'origine, à une température ne dépassant pas 25°C, hors de la portée des enfants.

## Contactez immédiatement le médecin en cas de :

- Signes infectieux ou T° > 38°C
- Taux de plaquettes inférieur à 50 000/mm<sup>3</sup> : augmentation du risque de saignements
- Taux de polynucléaires neutrophiles inférieur à 500/mm<sup>3</sup> : augmentation du risque d'infection
- Diarrhée importante avec plus de 4 selles liquides par jour : augmentation du risque de déshydratation



CENTRE  
HOSPITALIER  
UNIVERSITAIRE  
BORDEAUX

PÔLE PRODUITS DE SANTÉ  
**PHARMACIE**

**ABEMACICLIB –  
VERZENIOS®**

## Informations à l'attention des patients



**PHARMA VILLE HOP**

**PHARMACIE A USAGE INTERIEUR  
CHU de BORDEAUX**

Mail : [pharmavillehop@chu-bordeaux.fr](mailto:pharmavillehop@chu-bordeaux.fr)

Téléphone :

☐ Site Haut Lévêque : 05 57 65 64 95

☐ Site Saint-André : 05 57 82 25 44

☐ Site Pellegrin : 05 56 79 55 03



Votre médecin vous a prescrit Abémaciclib  
VERZENIOS® pour la prise en charge de votre  
cancer du sein en association à une  
hormonothérapie

## Présentation et conditions de prescription

Abémaciclib VERZENIOS® se présente sous la forme de comprimés dosés à 50 mg, 100 mg ou 150 mg. Il est prescrit par un médecin hospitalier spécialiste et est disponible uniquement en pharmacie de ville sur ordonnance. Il est nécessaire d'anticiper le renouvellement des ordonnances plusieurs jours à l'avance.

## Comment agit mon médicament ?

Abémaciclib VERZENIOS® agit en bloquant certaines protéines, diminuant ainsi la progression du cancer.

## Comment dois-je prendre mon médicament ?

Abémaciclib VERZENIOS® se prend par voie orale avec un verre d'eau :

- Deux fois par jour en continu
- Avec ou sans nourriture
- Au même moment de la journée

Les comprimés ne doivent pas être pris avec du jus de pamplemousse ou d'orange amère ni avec des produits à base de Millepertuis. Ils doivent être avalés entiers et ne doivent être ni écrasés, ni croqués, ni coupés ni mâchés.



Ne jamais arrêter le traitement ou modifier le rythme d'administration sans avis du prescripteur.

## Que dois-je faire en cas d'oubli ou de vomissement ?

Si vous avez oublié une prise, **vous ne devez jamais prendre de comprimés supplémentaires pour compenser un oubli de prise. Si oubli, attendre la prochaine prise**, à l'heure habituelle, ne pas prendre la dose oubliée.

Ne jamais doubler la dose suivante dans le but de rattraper une dose manquée.

Pour éviter les oublis, vous pouvez utiliser un pilulier.

En cas de vomissements après la prise, ne reprenez pas la dose du jour et ne doublez pas la dose suivante.

## Quels sont les principaux effets indésirables liés à ce traitement ?

Vous ne ressentirez pas forcément ces effets indésirables. En cas de survenue des symptômes suivants, informez votre médecin ou votre infirmière coordinatrice (IDEC).

- Troubles gastro-intestinaux : Nausées, vomissements, douleur abdominale, diarrhées, perte d'appétit, modification du goût
- Plaies douloureuses dans la bouche (aphtes, mucites)
- Troubles cutanés : démangeaisons, sécheresse cutanée
- Fatigue, vertiges, maux de tête : signe d'une élévation de la pression artérielle
- Infections : fièvre, frissons, toux

Vous pourriez peut-être voir sur votre prise de sang :

- Diminution des polynucléaires neutrophiles (globules blancs), peut être responsable d'infection
- Diminution des plaquettes, peut être responsable de saignements
- Diminution des globules rouges (anémie), peut être responsable d'essoufflement, de pâleur, de fatigue.

## Ce médicament provoque-t-il une chute des cheveux ?

Ce médicament peut provoquer une chute des cheveux.

## Comment prévenir et gérer la survenue de ces effets indésirables ?

- Signes d'infection : en prévention des infections, limitez les contacts avec les personnes infectées/contagieuses. Se laver fréquemment les mains ; désinfectez soigneusement toute plaie. Contactez votre médecin en cas de signes infectieux : fièvre > 38°C, frissons ou sueurs, toux, brûlures urinaires...
- Troubles digestifs :
  - En cas de diarrhées, évitez café, boissons glacées, lait, fruits et légumes crus, céréales, pain complet et alcool. Buvez si possible 2L par jour (eau, thé, bouillons).
  - En cas de constipation : buvez si possible 2L d'eau par jour. Privilégiez une alimentation riche en fibres (légumes verts, fruits, fruits secs).
  - En cas de nausées, vomissements : buvez entre les repas ; évitez les aliments frits, gras, épicés ; mangez lentement, faites plusieurs petits repas.
- Eruptions cutanées : en cas de symptômes, utilisez un savon doux et un agent hydratant et contactez votre médecin. En cas d'exposition solaire, utilisez une protection (écran total) et évitez les expositions prolongées.
- Fatigue, vertiges, somnolence : la fatigue est un effet attendu. Respectez des temps de repos dans la journée, mais essayez de conserver une activité même modérée. L'effet est majoré en cas de prise d'alcool.
- Aphtes et mucites : ayez une bonne hygiène bucco-dentaire, brossez-vous les dents avec une brosse à dents souple après chaque repas, suivi de bains de bouche.

Pour ces symptômes, une ordonnance de soins de support adaptés vous est remise par votre médecin oncologue. Si vous ressentez des effets non mentionnés, ou si ces effets sont sévères, n'hésitez pas à contacter votre médecin, IDEC ou votre pharmacien.