

## Existe t'il des interactions médicamenteuses avec mon

Certains médicaments ou plantes peuvent augmenter les effets indésirables de votre traitement ou diminuer son efficacité.

 Par conséquent, ne prenez aucun nouveau traitement (même sans ordonnance) sans avis médical.

Un intervalle de 2h est recommandé entre la prise de Dabrafénib TAFINLAR® - Tramétinib MEKINIST® et :

- Les médicaments utilisés pour soulager les aigreurs d'estomac (gaviscon®, Maalox®, Xolaam®, Phosphalugel® etc...)
- Les médicaments contenant du charbon ou de l'argile utilisés pour soulager les ballonnements comme (carbolevure®, carbosylane®, Bedelix®)

**Le millepertuis et le pamplemousse et les oranges sanguines de Séville sont contre-indiqués.**

Une surveillance périodique sera effectuée si vous êtes sous anticoagulants en raison du risque hémorragique.

 **Pensez à donner la liste complète des médicaments, plantes ou tisanes à votre médecin ou à votre pharmacien.**

## Que faire en cas de déplacement ou de voyage ?

Pensez à prendre avec vous votre traitement en quantité suffisante. Pensez également à prendre votre ordonnance originale pour un éventuel renouvellement. En cas de décalage horaire, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

## Que faire en cas d'intervention chirurgicale ?

Il faut absolument signaler que vous prenez Dabrafénib TAFINLAR® - Tramétinib MEKINIST® avant tout geste chirurgical ou de chirurgie dentaire (même une extraction dentaire).

## Recommandations générales



Se laver les mains avant et après chaque manipulation des comprimés.



De préférence, ramenez les boîtes de Dabrafénib TAFINLAR® - Tramétinib MEKINIST® entamées et les emballages vides à votre pharmacie en fin de traitement.



Protégez-vous du soleil et évitez les expositions prolongées.



Une contraception efficace doit être poursuivie pendant la durée du traitement.



Le médicament doit être conservé dans sa boîte d'origine, à une température ne dépassant pas 25°C, hors de la portée des enfants.

## Contactez immédiatement le médecin en cas de :

- Signes infectieux ou  $T^{\circ} > 38^{\circ}C$
- Taux de plaquettes inférieur à 50 000/mm<sup>3</sup> : augmentation du risque de saignements
- Taux de polynucléaires neutrophiles inférieur à 500/mm<sup>3</sup> : augmentation du risque d'infection
- Diarrhée importante avec plus de 4 selles liquides par jour : augmentation du risque de déshydratation.

CHU  
BDX

CENTRE  
HOSPITALIER  
UNIVERSITAIRE  
BORDEAUX

PÔLE PRODUITS DE SANTÉ  
PHARMACIE

DABRAFENIB – TAFINLAR®  
TRAMETINIB – MEKINIST®

## Informations à l'attention des patients

CHU  
BDX

PHARMA VILLE HOP

PHARMACIE A USAGE INTERIEUR  
CHU de BORDEAUX

Mail : [pharmavillehop@chu-bordeaux.fr](mailto:pharmavillehop@chu-bordeaux.fr)

Téléphone :

- Site Haut Lévêque : 05 57 65 64 95
- Site Saint-André : 05 57 82 25 44
- Site Pellegrin : 05 56 79 55 03



Votre médecin vous a prescrit Dabrafénib TAFINLAR® - Tramétinib MEKINIST® pour la prise en charge de votre hémopathie

## Présentation et conditions de prescription

Dabrafénib TAFINLAR® et Tramétinib MEKINIST® se présente sous la forme de gélules dosées à 75 mg pour le Dabrafénib TAFINLAR® et sous forme de comprimés à 2 mg pour le Tramétinib MEKINIST®. Ces médicaments sont prescrits par un médecin hospitalier spécialiste et est disponible uniquement en pharmacie de ville sur ordonnance. Il est nécessaire d'anticiper le renouvellement des ordonnances plusieurs jours à l'avance

## Comment agit mon médicament ?

Dabrafénib TAFINLAR® - Tramétinib MEKINIST® empêche la tumeur de proliférer.

## Comment dois-je prendre mon médicament ?

**TAFINLAR®** : 2 prises par jour, matin **ET** soir, au moins 1 heure avant ou au moins deux heures après un repas.

**MEKINIST®** : 1 prise par jour, à prendre matin **OU** soir, en même temps que le TAFINLAR®

Les comprimés et gélules doivent être avalés entiers avec un verre d'eau



Ne jamais arrêter le traitement ou modifier le rythme d'administration sans avis du prescripteur.

Les comprimés et les gélules ne doivent pas être pris avec **du jus de pamplemousse** ou **d'orange amère** ni avec des produits à base de **Millepertuis**. Ils doivent être avalés entiers et ne doivent être ni écrasés, ni croqués, ni mâchés.

## Que dois-je faire en cas d'oubli ou de vomissement ?

En cas d'oubli d'une prise, prenez la dose dès que possible le même jour dans les 6 heures qui suivent la prise habituelle pour le Dabrafénib TAFINLAR® et dans les 12h pour le Tramétinib MEKINIST® avec un retour à l'heure habituelle le jour suivant.

Pour éviter les oublis vous pouvez utiliser un pilulier.

Ne jamais doubler la dose suivante dans le but de rattraper une dose manquée.

En cas de vomissements après la prise, ne reprenez pas la dose du jour et ne doublez pas la dose suivante.

## Quels sont les principaux effets indésirables liés à ce traitement ?

Vous ne ressentirez pas forcément ces effets indésirables, ils varient en fonction des personnes. En cas de survenue des symptômes suivants, informez votre médecin ou votre infirmière coordinatrice (IDEC).

- Troubles gastro-intestinaux : Nausées, vomissements, douleur abdominale, diarrhées, perte d'appétit, modification du goût
- Signes généraux : fièvre 38°-38.5°C, toux, frissons, maux de gorge, syndrome grippal
- Douleurs articulaires et musculaires, fatigue
- Troubles cardiaques : essoufflement, douleur thoracique intense, étourdissement, engourdissement d'une partie du visage, d'un bras ou d'une jambe, perte soudaine d'équilibre, sueurs froides.
- Troubles cutanés : apparition ou modification de grains de beauté, apparition de verrues et épaississement de la peau des plantes
- Fatigue, vertiges, maux de tête (signes d'une élévation de la pression artérielle)
- Pneumopathie intersticielle : toux, difficulté respiratoire
- Troubles visuels : douleurs, vision floue, sécheresse oculaire

## Ce médicament provoque-t-il une chute des cheveux ?

Ces médicaments peuvent provoquer une chute des cheveux.

## Comment prévenir et gérer la survenue de ces effets indésirables ?

**Surveillance de la fonction cardiaque** : réalisation régulière ECG et ETT et mesure de la tension artérielle par mon médecin traitant ou mon cardiologue.

**Je me protège du soleil** : J'applique de la crème solaire indice fort, je mets des lunettes de soleil, je porte un chapeau, j'évite les expositions prolongées au soleil. Je surveille ma peau pour repérer l'apparition de plaques brunes, de verrues... sur les zones exposées aux UVs. En cas d'apparition suspecte, j'en informe mon médecin et mon infirmière coordinatrice.

*Pour ces symptômes, une ordonnance de soins de support adaptés vous est remise par votre médecin oncologue. Si vous ressentez des effets non mentionnés, ou si ces effets sont sévères, n'hésitez pas à contacter votre médecin, IDEC ou votre pharmacien.*