

Existe-t'il des interactions médicamenteuses avec mon

Certains médicaments peuvent augmenter les effets indésirables de votre traitement ou diminuer son efficacité.

 Par conséquent, ne prenez aucun nouveau traitement (même sans ordonnance) sans avis médical.

■ Les médicaments antiacides sont à éviter avec Erlotinib TARCEVA® (Ex : Inexium® esoméprazole, Mopral® Oméprazole, Pariet® rabéprazole et Lanzor® Lansoprazole, cimétidine, Azantac® ranitidine...). Les antiacides doivent être pris au moins 4h avant ou 2 heures après la prise quotidienne de Erlotinib TARCEVA®.

■ Les antiacide à action locale utilisées pour soulager les aigreurs d'estomac (Gaviscon, Maalox, Xolaam, Phosphalugel, etc...) sont à utiliser uniquement sur avis médical.

■ Un intervalle de 2h est recommandé entre la prise de Erlotinib TARCEVA® et les médicaments contenant du charbon ou de l'argile utilisées pour soulager les ballonnements comme (carbolevure® , carbosylane® , Bedelix®)

Le millepertuis et le pamplemousse sont contre-indiqués.

Une surveillance périodique sera effectuée si vous êtes sous anticoagulants en raison du risque hémorragique.

 **Pensez à donner la liste complète des médicaments, plantes ou tisanes à votre médecin ou à votre pharmacien.**

Que faire en cas de déplacement ou de voyage ?

Pensez à prendre avec vous votre traitement en quantité suffisante. Pensez également à prendre votre ordonnance originale pour un éventuel renouvellement. En cas de décalage horaire, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que faire en cas d'intervention chirurgicale ?

Il faut absolument signaler que vous prenez Erlotinib TARCEVA® avant tout geste chirurgical ou de chirurgie dentaire (même une extraction dentaire).

Recommandations générales



Se laver les mains avant et après chaque manipulation des comprimés.



De préférence, ramenez les boîtes d'Erlotinib TARCEVA® entamées et les emballages vides à votre pharmacie en fin de traitement.



Protégez-vous du soleil et évitez les expositions prolongées.



Une contraception efficace doit être poursuivie pendant la durée du traitement. Il sera conseillé de poursuivre une contraception au moins 2 semaines après l'arrêt du traitement.



Le médicament doit être conservé dans sa boîte d'origine, à une température ne dépassant pas 25°C, hors de la portée des enfants.

Contactez immédiatement le médecin en cas de :

- Signes infectieux ou T° > 38°C
- Taux de plaquettes inférieur à 50 000/mm³ : augmentation du risque de saignements
- Taux de polynucléaires neutrophiles inférieur à 500/mm³ : augmentation du risque d'infection
- Diarrhée importante avec plus de 4 selles liquides par jour : augmentation du risque de déshydratation

CHU
BDX

CENTRE
HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE
BORDEAUX

PÔLE PRODUITS DE SANTÉ
PHARMACIE

ERLOTINIB – TARCEVA®

Informations à l'attention des patients

CHU
BDX

PHARMA VILLE HOP

PHARMACIE A USAGE INTERIEUR
CHU de BORDEAUX

Mail : pharmavillehop@chu-bordeaux.fr

Téléphone :

Site Haut Lévêque : 05 57 65 64 95

Site Saint-André : 05 57 82 25 44

Site Pellegrin : 05 56 79 55 03



Votre médecin vous a prescrit Erlotinib TARCEVA® pour la prise en charge de votre hémopathie

Présentation et conditions de prescription

Erlotinib TARCEVA® se présente sous la forme de comprimés dosés à 25 mg, 100 mg et 150 mg. Il est prescrit par un médecin hospitalier spécialiste et est disponible uniquement en pharmacie de ville sur ordonnance. Il est nécessaire d'anticiper le renouvellement des ordonnances plusieurs jours à l'avance.

Comment agit mon médicament ?

Erlotinib TARCEVA® empêche le développement et la croissance des cellules tumorales.

Comment dois-je prendre mon médicament ?

Erlotinib TARCEVA® se prend par voie orale avec un verre d'eau :

- Une fois par jour en continu
- En dehors des repas (une heure avant ou deux heures après)
- Au même moment de la journée de préférence le matin

Les comprimés ne doivent pas être pris avec **du jus de pamplemousse** ou **d'orange amère** ni avec des produits à base de **Millepertuis**. Ils doivent être avalés entiers et ne doivent être ni écrasés, ni croqués, ni coupés, ni mâchés, ni dispersés.



Ne jamais arrêter le traitement ou modifier le rythme d'administration sans avis du prescripteur.

Que dois-je faire en cas d'oubli ou de vomissement ?

Si vous avez oublié une prise, **si l'oubli est supérieur à 6h, attendre la prochaine prise, ne pas prendre la dose oubliée. Si l'oubli est inférieur à 6h, prendre la dose oubliée.**

Ne jamais doubler la dose suivante dans le but de rattraper une dose manquée.

En cas de vomissements après la prise, ne reprenez pas la dose du jour et ne doublez pas la dose suivante.

Quels sont les principaux effets indésirables liés à ce traitement ?

Vous ne ressentirez pas forcément ces effets indésirables. En cas de survenue des symptômes suivants, informez votre médecin ou votre infirmière coordinatrice (IDEC).

- Troubles gastro-intestinaux : Nausées, vomissements, douleur abdominale, diarrhées, perte d'appétit, modification du goût
- Affections cutanées : rougeur de la peau, démangeaisons, assèchement de la peau, acné, inflammation et rougeur du pourtour de l'ongle
- Plaies douloureuses dans la bouche
- Fatigue, vertiges, maux de tête : signe d'une élévation de la pression artérielle
- Troubles de la vision : sécheresse oculaire, conjonctivite

Vous pourriez peut-être voir sur votre prise de sang :

- Perturbation du bilan hépatique

Ce médicament provoque-t-il une chute des cheveux ?

Ce médicament peut provoquer une chute des cheveux.

Comment prévenir et gérer la survenue de ces effets indésirables ?

Troubles digestifs :

- En cas de diarrhées, évitez café, boissons glacées, lait, fruits et légumes crus, céréales, pain complet et alcool. Buvez si possible 2L par jour (eau, thé, bouillons).
- En cas de constipation : buvez si possible 2L d'eau par jour. Privilégiez une alimentation riche en fibres (légumes verts, fruits, fruits secs).
- En cas de nausées, vomissements : buvez entre les repas ; évitez les aliments frits, gras, épicés ; mangez lentement, faites plusieurs petits repas.

Eruptions cutanées (syndrome mains-pieds) : en cas de symptômes, utilisez un savon doux et un agent hydratant et contactez votre médecin. En cas d'exposition solaire, utilisez une protection (écran total) et évitez les expositions prolongées.

Aphtes et mucites : ayez une bonne hygiène bucco-dentaire, brossez-vous les dents avec une brosse à dents souple après chaque repas, suivi de bains de bouche.

Pour ces symptômes, une ordonnance de soins de support adaptés vous est remise par votre médecin oncologue. Si vous ressentez des effets non mentionnés, ou si ces effets sont sévères, n'hésitez pas à contacter votre médecin, IDEC ou votre pharmacien.