

Existe-t'il des interactions médicamenteuses avec mon

Certains médicaments ou plantes peuvent augmenter les effets indésirables de votre traitement ou diminuer son efficacité.

 Par conséquent, ne prenez aucun nouveau traitement (même sans ordonnance) sans avis médical.

Un intervalle de 2h est recommandé entre la prise de Encorafénib Braftovi® et :

- Les médicaments utilisés pour **soulager les aigreurs d'estomac** (Gaviscon®, Maalox®, Xolaam®, Pharnalugel® etc...)
- Les médicaments contenant du charbon ou de l'argile utilisés pour **soulager les ballonnements** (carbolevure®, carbosylane®, Bedelix®)

Le pamplemousse, les oranges de Séville et le millepertuis sont contre-indiqués.

Une surveillance périodique sera effectuée si vous êtes sous anticoagulants en raison du risque hémorragique.

 **Pensez à donner la liste complète des médicaments, plantes ou tisanes à votre médecin ou à votre pharmacien.**

Que faire en cas de déplacement ou de voyage ?

Pensez à prendre avec vous votre traitement en quantité suffisante. Pensez également à prendre votre ordonnance originale pour un éventuel renouvellement. En cas de décalage horaire, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que dois-je faire en cas d'intervention chirurgicale ?

Il faut absolument signaler que vous prenez Encorafénib Braftovi® avant tout geste chirurgical ou de chirurgie dentaire (même une extraction dentaire)

Recommandations générales



Se laver les mains avant et après chaque manipulation des comprimés.



De préférence, ramenez les boîtes entamées de Encorafénib Braftovi® et les emballages vides à votre pharmacie en fin de traitement.



Protégez-vous du soleil et évitez les expositions prolongées.



Une contraception efficace doit être poursuivie pendant le traitement.



Le médicament doit être conservé dans sa boîte d'origine, à une température ne dépassant pas 25°C, hors de la portée des enfants.

Contactez immédiatement le médecin en cas de :

- Signes infectieux ou $T^{\circ} > 38^{\circ}\text{C}$
- Taux de plaquettes inférieur à $50\ 000/\text{mm}^3$: augmentation du risque de saignements
- Taux de polynucléaires neutrophiles inférieur à $500/\text{mm}^3$: augmentation du risque d'infection
- Diarrhée importante avec plus de 4 selles liquides par jour : augmentation du risque de déshydratation.



CENTRE
HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE
BORDEAUX

PÔLE PRODUITS DE SANTÉ
PHARMACIE

ENCORAFENIB – BRAFTOVI®

Informations à l'attention des patients



PHARMA VILLE HOP

PHARMACIE A USAGE INTERIEUR
CHU de BORDEAUX

Mail : pharmavillehop@chu-bordeaux.fr

Téléphone :

Site Haut Lévêque : 05 57 65 64 95

Site Saint-André : 05 57 82 25 44

Site Pellegrin : 05 56 79 55 03



Votre médecin vous a prescrit Encorafénib BRAFTOVI® pour la prise en charge de votre pathologie oncologique

Présentation et conditions de prescription

Encorafénib Braftovi® se présente sous la forme de gélules dosées à 50 ou 75 mg. Il est prescrit par un médecin hospitalier spécialiste et est disponible uniquement en pharmacie de ville sur ordonnance. Il est nécessaire d'anticiper le renouvellement des ordonnances plusieurs jours à l'avance.

Comment agit mon médicament ?

Encorafénib Braftovi® empêche la tumeur de proliférer.

Comment dois-je prendre mon médicament ?

Encorafénib se prend par voie orale avec un verre d'eau :

- au cours ou en dehors d'un repas,
- toujours au même moment de la journée,
- en une prise par jour en continue,

Ce médicament est prescrit en association avec une perfusion de Cetuximab qui a lieu toutes les deux semaines.



Ne jamais arrêter le traitement ou modifier le rythme d'administration sans avis du prescripteur.

Les gélules doivent être **avalées entières et ne doivent être ni écrasés, ni croqués, ni mâchés.**

Que dois-je faire en cas d'oubli ou de vomissement ?

Si vous avez oublié une prise : si l'oubli est > à 12h, attendre la prochaine prise et ne pas prendre la dose oubliée. **Si l'oubli est < à 12H, prendre la dose oubliée.**

Ne jamais doubler la dose suivante dans le but de rattraper une dose manquée.

En cas de vomissements après la prise, ne reprenez pas la dose du jour et ne doublez pas la dose suivante.

Quels sont les principaux effets indésirables liés à ce traitement ?

Vous ne ressentirez pas forcément ces effets indésirables. En cas de survenue des symptômes suivants, informez votre médecin ou votre infirmière coordinatrice (IDEC).

- Troubles gastro-intestinaux :
 - Nausées, vomissements
 - Diarrhées
 - Perte d'appétit, du goût, amaigrissement
- Syndrome mains-pieds :
 - Douleur, rougeur de la paume des mains et/ou de la plante des pieds
 - Fourmillements
 - Sécheresse cutanée
- Troubles cutanés :
 - Plaques rouges squameuses
 - Plaies ouvertes
 - Apparition de grains de beauté, ressemblant à des verrues, inexistants avant le début du traitement
- Saignements inhabituels (de nez, urines, selles...)
- Douleurs musculaires
- Troubles oculaire
- Infections :
 - Fièvre/Frissons
 - Toux

Ce médicament provoque-t-il une chute des cheveux ?

Ce médicament peut provoquer la chute des cheveux.

Comment prévenir et gérer la survenue de ces effets indésirables ?

Je surveille ma peau pour repérer l'**apparition de plaques rouges, de verrues** etc au niveau du visage, des oreilles, du cuir chevelu, des épaules, des avants bras et toutes zones exposées aux UVs.

Je me protège du soleil : J'applique de la crème solaire indice fort, je mets des lunettes de soleil, je porte un chapeau, j'évite les expositions prolongées au soleil. **En cas d'apparition suspecte**, j'en informe mon médecin ou mon infirmière coordinatrice.

Je prends des précautions pour éviter le **syndrome main-pied** :

Quotidiennement, appliquez des **crèmes sans parfum, hydratantes**, pour peaux très sèches sur les zones atteintes.

J'évite l'exposition des mains et des pieds à la chaleur ou au froid intense.

En cas de symptômes, j'en informe mon médecin ou mon infirmière coordinatrice.

Pour ces symptômes, une ordonnance de soins de support adaptés vous est remise par votre médecin oncologue. Si vous ressentez des effets non mentionnés, ou si ces effets sont sévères, n'hésitez pas à contacter votre médecin, IDEC ou votre pharmacien.