

Existe-t'il des interactions médicamenteuses avec mon

Certains médicaments peuvent augmenter les effets indésirables de votre traitement ou diminuer son efficacité.

 Par conséquent, ne prenez aucun nouveau traitement (même sans ordonnance) sans avis médical.

Parmi les médicaments contre-indiqués, on trouve :

- Les médicaments inhibiteurs ou inducteurs de la protéine CYP3A4
- Les traitements anticoagulants
- Le paracétamol **à forte dose**

Le **pamplemousse** et le **millepertuis** sont **contre-indiqués**, ils peuvent modifier les concentrations d'imatinib.

 **Pensez à donner la liste complète des médicaments, plantes ou tisanes à votre médecin ou à votre pharmacien.**

Que faire en cas de déplacement ou de voyage ?

Pensez à prendre avec vous votre traitement en quantité suffisante. Pensez également à prendre votre ordonnance originale pour un éventuel renouvellement. En cas de décalage horaire, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que dois-je faire en cas d'intervention chirurgicale ?

Il faut absolument signaler que vous prenez Imatinib GLIVEC® avant tout geste chirurgical ou de chirurgie dentaire.

Recommandations générales



Se laver les mains avant et après chaque manipulation des comprimés.



De préférence, ramenez les boîtes d'Imatinib GLIVEC® entamées et les emballages vides à votre pharmacie en fin de traitement.



Protégez-vous du soleil et évitez les expositions prolongées.



GLIVEC® est contre-indiqué pendant la grossesse et l'allaitement. Si vous êtes une femme en âge de procréer, utilisez une méthode de contraception efficace pendant et jusqu'à 3 mois après l'arrêt du traitement. Si vous utilisez une méthode de contraception hormonale, ajoutez une méthode de contraception mécanique (préservatif).



Le médicament doit être conservé dans sa boîte d'origine, à une température ne dépassant pas 25°C, hors de la portée des enfants. **Contactez immédiatement le médecin en cas de :**

- Signes infectieux ou T° > 38°C
- Taux de plaquettes inférieur à 50 000/mm³ : augmentation du risque de saignements
- Taux de polynucléaires neutrophiles inférieur à 500/mm³ : augmentation du risque d'infection
- Si plus de 4 selles liquides par jour (diarrhée importante)



CENTRE
HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE
BORDEAUX

PÔLE PRODUITS DE SANTÉ
PHARMACIE

Imatinib - GLIVEC®

Informations à l'attention des patients



PHARMA VILLE HOP

PHARMACIE A USAGE INTERIEUR
CHU de BORDEAUX

Mail : pharmavillehop@chu-bordeaux.fr

Téléphone :

Site Haut Lévêque : 05 57 65 64 95

Site Saint-André : 05 57 82 25 44

Site Pellegrin : 05 56 79 55 03



Votre médecin vous a prescrit Imatinib GLIVEC® pour la prise en charge de votre pathologie oncologique

Présentation et conditions de prescription

Imatinib GLIVEC® se présente sous la forme de comprimés dosés à 100 mg et 400 mg. Il est prescrit par un médecin hospitalier spécialiste et est disponible uniquement en pharmacie de ville sur ordonnance. Il est nécessaire d'anticiper le renouvellement des ordonnances plusieurs jours à l'avance.

Comment agit mon médicament ?

Imatinib GLIVEC® est une thérapie ciblée, empêchant la tumeur de proliférer en provoquant la mort des cellules tumorales.

Comment dois-je prendre mon médicament ?

Imatinib GLIVEC® se prend par voie orale avec un verre d'eau :

- au cours d'un repas en position assise afin de réduire le risque d'irritations gastro-intestinales
- toujours au même moment de la journée,
- en une prise ou deux prises par jour selon votre prescription,

Si vous ne pouvez pas avaler les comprimés **il est possible de les disperser dans de l'eau ou du jus de pomme (200ml pour 1 comprimée de 400 mg)**. Les comprimés **ne doivent être ni écrasés, ni mâchés, ni croqués**.



Ne jamais arrêter le traitement ou modifier le rythme d'administration sans avis du prescripteur. La dose prescrite par votre médecin est strictement personnelle.

Que dois-je faire en cas d'oubli ou de vomissement ?

Si vous avez oublié une prise, prenez la dose oubliée dès que vous vous rendez compte de l'oubli.

Ne jamais doubler la dose suivante dans le but de rattraper une dose manquée.

En cas de vomissements après la prise, ne reprenez pas la dose du jour et ne doublez pas la dose suivante.

Quels sont les principaux effets indésirables liés à ce traitement ?

Vous ne ressentirez pas forcément ces effets indésirables. En cas de survenue des symptômes suivants, informez votre médecin ou votre infirmière coordinatrice (IDEC).

- **Troubles gastro-intestinaux** : Nausées, douleur abdominale, vomissements, diarrhées, perte d'appétit, modification du goût
- **Rétention d'eau, prise de poids, oedèmes**
- **Céphalées**
- **Saignements inhabituels** (de nez, urines, selles etc)
- **Crampes musculaires, douleurs articulaires**
- **Rash cutanée à type eczéma**
- **Troubles de la vision** : sécheresse oculaire, conjonctivite
- **Infections** : fièvre/frissons, toux

Vous pourrez peut-être voir sur votre prise de sang :

- **Diminution des polynucléaires neutrophiles** (= globules blancs), peut-être responsable d'infection
- **Diminution des plaquettes**, peut-être responsable de saignements
- **Diminution des globules rouges (anémie)**, peut être responsable d'essoufflement, de pâleur, de fatigue.
- **Augmentation des enzymes hépatiques** (ALAT, ASAT) = trouble de la fonction hépatique

Ce médicament provoque-t-il une chute des cheveux ?

Ce médicament peut provoquer une chute des cheveux.

Comment prévenir et gérer la survenue de certains effets

- **Signes d'infection** : en prévention des infections, limitez les contacts avec les personnes infectées/contagieuses. Se laver fréquemment les mains ; désinfectez soigneusement toute plaie. Contactez votre médecin en cas de signes infectieux : fièvre > 38°C, frissons ou sueurs, toux, brûlures urinaires...
 - **Troubles digestifs** :
 - en cas de diarrhées, évitez café, boissons glacées, lait, fruits et légumes crus, céréales, pain complet et alcool. Buvez si possible 2L par jour (eau, thé, bouillons...).
 - **Saignements inhabituels** : évitez les anti-inflammatoires (aspirine, ibuprofène), les sports violents, prudence avec les objets coupants (jardinage, cuisine). En cas de saignements buccaux, préférez une brosse à dents souple. Contactez votre médecin en cas de saignements anormaux, apparition de bleus, taches rouges sur la peau...
 - **Fatigue, vertiges, somnolence** : la fatigue est un effet attendu. Respectez des temps de repos dans la journée, mais essayez de conserver une activité même modérée. L'effet est majoré en cas de prise d'alcool.
- Pour ces symptômes, une ordonnance de soins de support adaptés peut vous être remise par votre médecin oncologue. Si vous ressentez des effets non mentionnés, ou si ces effets sont sévères, n'hésitez pas à contacter votre médecin, IDEC ou votre pharmacien.*