

Existe-t'il des interactions médicamenteuses avec mon

Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments ou avec des plantes.

Certains médicaments peuvent augmenter les effets indésirables de votre traitement ou diminuer son efficacité.

 Par conséquent, ne prenez aucun nouveau traitement (même sans ordonnance) sans avis médical.

Un intervalle de 2h est recommandé entre la prise de LENVIMA® (Lenvatinib) et :

- Médicaments utilisés pour soulager les aigreurs d'estomac (Gaviscon®, Maalox®, Xolaam®, Phosphalugel® etc...).
- Les médicaments contenant du charbon ou de l'argile utilisés pour soulager les ballonnements (carbolevure®, carbosylane®, Bedelix®)

Une surveillance périodique sera effectuée si vous êtes sous anticoagulants en raison du risque hémorragique.

Les gélules ne doivent pas être prises avec du jus de pamplemousse ou d'oranges amères ni avec des produits à base de millepertuis.

 **Pensez à donner la liste complète des médicaments, plantes ou tisanes à votre médecin ou à votre pharmacien.**

Que faire en cas de déplacement ou de voyage ?

Pensez à prendre avec vous votre traitement en quantité suffisante. Pensez également à prendre votre ordonnance originale pour un éventuel renouvellement. En cas de décalage horaire, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que faire en cas d'intervention chirurgicale ?

Il faut absolument signaler que vous prenez Lenvima® (Lenvatinib) avant tout geste chirurgical ou de chirurgie dentaire (même une extraction dentaire).

Recommandations générales



Se laver les mains avant et après chaque manipulation des comprimés.



De préférence, ramenez les boîtes de Lenvima® (Lenvatinib) entamées et les emballages vides à votre pharmacie en fin de traitement.



Une contraception efficace doit être poursuivie pendant le traitement. Il sera conseillé de poursuivre une contraception au moins 1 mois après l'arrêt du traitement par Lenvima®.



Le médicament doit être conservé dans sa boîte d'origine, à une température ne dépassant pas 25°C, hors de la portée des enfants.

Contactez immédiatement le médecin en cas de :

- **Signes infectieux** ou T° > 38°C
- **Taux de plaquettes inférieur à 50 000/mm³** : augmentation du risque de saignements
- **Taux de polynucléaires neutrophiles inférieur à 500/mm³** : augmentation du risque d'infection
- **Diarrhée importante** avec plus de 4 selles liquides par jour : augmentation du risque de déshydratation.



CENTRE
HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE
BORDEAUX

PÔLE PRODUITS DE SANTÉ
PHARMACIE

LENVATINIB – LENVIMA®

Informations à l'attention des patients



PHARMA VILLE HOP

PHARMACIE A USAGE INTERIEUR
CHU de BORDEAUX
Mail : pharmavillehop@chu-bordeaux.fr
Téléphone :
 Site Haut Lévéque : 05 57 65 64 95
 Site Saint-André : 05 57 82 25 44
 Site Pellegrin : 05 56 79 55 03



Présentation et conditions de prescription

Votre médecin vous a prescrit Lenvima® (lenvatinib) pour la prise en charge de votre pathologie oncologique.

Comment agit mon médicament ?

Lenvima® (lenvatinib) empêche la tumeur de se créer de nouveaux vaisseaux sanguins et de proliférer.

Comment dois-je prendre mon médicament ?

Lenvima (lenvatinib) se prend **une fois par jour en continu, avec ou sans nourriture.**

Les gélules ne doivent être ni ouvertes, ni mâchées. Les gélules peuvent être mélangées à une cuillère à soupe d'eau ou de jus de pomme.

Il est préférable de prendre votre médicament tous les jours, **au même moment de la journée avec un grand verre d'eau.**

La dose prescrite par votre médecin est strictement personnelle.



Pour éviter les oublis, vous pouvez utiliser un pilulier. **Ne jamais arrêter le traitement** ou modifier le rythme d'administration sans avis du prescripteur.

Que dois-je faire en cas d'oubli ou de vomissement ?

Si oubli > 12h, attendre la prochaine prise, ne pas prendre la dose oubliée.

Si oubli < 12h, prendre la dose oubliée.

En cas de vomissement, attendre la prochaine prise.

Quels sont les principaux effets indésirables liés à ce traitement ?

Vous ne ressentirez pas forcément ces effets indésirables. En cas de survenue des symptômes suivants, informez votre médecin ou votre infirmière coordinatrice (IDEC).

- **Troubles gastro-intestinaux :**
Nausées, vomissements
Diarrhées,
Perte d'appétit, du goût, amaigrissement
- **Syndrome mains pieds :**
Douleur, rougeur de la paume des mains et/ou de la plante des pieds
Fourmillements
Sécheresse cutanée
- **Plaies douloureuses dans la bouche** (aphtes, mucites)
- **Saignements inhabituels** (de nez, urines, selles...)
- **Fatigue, vertiges, maux de tête** (signes d'une élévation de la pression artérielle)
- **Infections :**
Fièvre/frissons
Toux

Vous pourrez peut-être voir sur votre prise de sang :

- Diminution des polynucléaires neutrophiles (globules blancs), peut être responsable d'infection
- Diminution des plaquettes, peut-être responsable de saignements
- Diminution des globules rouges (anémie), peut-être responsable d'essoufflement, de pâleur, de fatigue.

Ce médicament provoque-t-il une chute des cheveux ?

Ce médicament peut provoquer une **chute des cheveux**.

Comment prévenir certains effets indésirables ? Quand contacter rapidement le médecin ?

Je prends des précautions pour éviter le syndrome **main-pied** :

Quotidiennement, appliquez des **crèmes sans parfum, hydratantes**, pour peaux très sèches sur les zones atteintes.

J'évite l'exposition des mains et des pieds à la chaleur ou au froid intense.

En cas de symptômes, j'en informe mon médecin ou mon infirmière coordinatrice.

Je prends des précautions pour éviter **aphtes et mucites** :

J'ai une bonne hygiène bucco-dentaire : je me brosse les dents avec une brosse à dents souple après chaque repas, suivi de bains de bouche.

En cas de douleurs importantes, j'en informe mon médecin ou mon infirmière coordinatrice.

Ma tension artérielle sera suivie régulièrement pour dépister une **hypertension artérielle**. Si nécessaire, elle sera traitée de façon appropriée.

Dans le cas d'une augmentation de la tension artérielle, un traitement anti-hypertenseur pourra m'être prescrit par mon médecin oncologue, mon médecin traitement ou mon cardiologue.

Pour ces symptômes, une ordonnance de soins de support adaptés vous est remise par votre médecin oncologue. Si vous ressentez des effets non mentionnés, ou si ces effets sont sévères, n'hésitez pas à contacter votre médecin, IDEC ou votre pharmacien.