

Existe-t'il des interactions médicamenteuses avec mon

Certains médicaments peuvent augmenter les effets indésirables de votre traitement ou diminuer son efficacité.

 Par conséquent, ne prenez aucun nouveau traitement (même sans ordonnance) sans avis médical.

Un intervalle de 2h est recommandé entre la prise de Lorlatinib LORVIQUA® et :

■ Les médicaments utilisés pour soulager les aigreurs d'estomac (gaviscon® , Maalox® , Xolaam® , Phosphalugel® etc...)

■ Les médicaments contenant du charbon ou de l'argile utilisés pour soulager les ballonnements comme (carbolevure® , carbosylane® , Bedelix®)

Le millepertuis est contre-indiqué, il peut diminuer la concentration de Lorlatinib LORVIQUA® et diminuer ainsi son efficacité.

Le pamplemousse ainsi que les oranges amères (orange de Séville) sont contre-indiqués, ils peuvent augmenter la concentration Lorlatinib LORVIQUA® et provoquer sur surdosage.

Une surveillance périodique sera effectuée si vous êtes sous anticoagulants en raison du risque hémorragique.

 **Pensez à donner la liste complète des médicaments, plantes ou tisanes à votre médecin ou à votre pharmacien.**

Que faire en cas de déplacement ou de voyage ?

Pensez à prendre avec vous votre traitement en quantité suffisante. Pensez également à prendre votre ordonnance originale pour un éventuel renouvellement. En cas de décalage horaire, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que faire en cas d'intervention chirurgicale ?

Il faut absolument signaler que vous prenez Lorlatinib LORVIQUA® avant tout geste chirurgical ou de chirurgie dentaire (même une extraction dentaire).

Recommandations générales



Se laver les mains avant et après chaque manipulation des comprimés.



De préférence, ramenez les boîtes de Lorlatinib LORVIQUA® entamées et les emballages vides à votre pharmacie en fin de traitement.



Protégez-vous du soleil et évitez les expositions prolongées.



Une contraception efficace doit être poursuivie pendant la durée du traitement et jusqu'à 35 jours après la dernière prise pour une femme et jusqu'à 14 semaines après la dernière prise pour un homme



Le médicament doit être conservé dans sa boîte d'origine, à une température ne dépassant pas 25°C, hors de la portée des enfants.

Contactez immédiatement le médecin en cas de :

- Signes infectieux ou $T^{\circ} > 38^{\circ}\text{C}$
- Taux de plaquettes inférieur à $50\,000/\text{mm}^3$: augmentation du risque de saignements
- Taux de polynucléaires neutrophiles inférieur à $500/\text{mm}^3$: augmentation du risque d'infection
- Diarrhée importante avec plus de 4 selles liquides par jour : augmentation du risque de déshydratation



PÔLE PRODUITS DE SANTÉ
PHARMACIE

LORLATINIB – LORVIQUA®

Informations à l'attention des patients



PHARMA VILLE HOP

**PHARMACIE A USAGE INTERIEUR
CHU de BORDEAUX**

Mail : pharmavillehop@chu-bordeaux.fr

Téléphone :

☐ Site Haut Lévêque : 05 57 65 64 95

☐ Site Saint-André : 05 57 82 25 44

☐ Site Pellegrin : 05 56 79 55 03



Votre médecin vous a prescrit Lorlatinib LORVIQUA® pour la prise en charge de votre cancer pulmonaire

Présentation et conditions de prescription

Lorlatinib LORVIQUA® se présente sous la forme de comprimés dosés à 25 mg et 100 mg. Il est prescrit par un médecin hospitalier spécialiste et est disponible uniquement en pharmacie de ville sur ordonnance. Il est nécessaire d'anticiper le renouvellement des ordonnances plusieurs jours à l'avance.

Comment agit mon médicament ?

Lorlatinib LORVIQUA® agit spécifiquement sur une mutation appelée ALK présente ALK présente sur les cellules cancéreuses et empêche le développement et la croissance des cellules tumorales.

Comment dois-je prendre mon médicament ?

Lorlatinib LORVIQUA® se prend par voie orale avec un verre d'eau :

- Une fois par jour en continu
- Au même moment de la journée
- Pendant ou en dehors d'un repas

Les comprimés ne doivent pas être pris avec du jus de pamplemousse ou d'orange amère ni avec des produits à base de Millepertuis. Ils doivent être avalés entiers et ne doivent être ni écrasés, ni coupés, ni dissouts, ni mâchés.



Ne jamais arrêter le traitement ou modifier le rythme d'administration sans avis du prescripteur.

Que dois-je faire en cas d'oubli ou de vomissement ?

Si vous avez oublié une prise, **s'il reste plus de 4h avant la prise suivante, prenez immédiatement la dose oubliée** et continuez votre traitement habituel, **s'il reste moins de 4h avant la prise suivante, ne prenez pas la dose manquante**, ne doublez pas la dose suivante.

Pour éviter les oublis, vous pouvez utiliser un pilulier.

Ne jamais doubler la dose suivante dans le but de rattraper une dose manquée.

En cas de vomissements après la prise, ne reprenez pas la dose du jour et ne doublez pas la dose suivante.

Quels sont les principaux effets indésirables liés à ce traitement ?

Vous ne ressentirez pas forcément ces effets indésirables. En cas de survenue des symptômes suivants, informez votre médecin ou votre infirmière coordinatrice (IDEC).

- Augmentation du poids, de la tension artérielle, oedèmes du visage et des membres,
- Fatigue, vertiges, maux de tête : signe d'une élévation de la pression artérielle
- Ralentissement de la pensée, troubles de l'humeur (effet rare mais important à signaler rapidement).
- Troubles gastro-intestinaux : Nausées, vomissements, douleur abdominale, diarrhées, perte d'appétit, modification du goût
- Éruption cutanée, dermites acnéiformes, photosensibilité
- Douleurs musculaires, articulaires
- Troubles de la vision : sécheresse oculaire, conjonctivite
- En cas de survenue de difficultés à respirer ou de toux, contactez votre médecin.

Vous pourriez peut-être voir sur votre prise de sang :

- Diminution des globules rouges (anémie), peut être responsable d'essoufflement, de pâleur, de fatigue.
- Augmentation de la glycémie, du taux de cholestérol et des triglycérides.
- Élévation de l'amylase et la lipase (perturbation du bilan pancréatique)

Ce médicament provoque-t-il une chute des cheveux ?

Ce médicament ne provoque pas de chute des cheveux.

Comment prévenir et gérer la survenue de ces effets indésirables ?

Signes d'infection : en prévention des infections, limitez les contacts avec les personnes infectées/contagieuses. Se laver fréquemment les mains ; désinfectez soigneusement toute plaie. Contactez votre médecin en cas de signes infectieux : fièvre > 38°C, frissons ou sueurs, toux, brûlures urinaires...

Troubles du métabolisme et de la nutrition : Il est important d'avoir un régime alimentaire équilibré. Un surveillance de mon bilan lipidique devra être effectuées régulièrement. Dans le cas d'une augmentation du taux de cholestérol ou triglycérides un traitement hypolipémiant pourra m'être prescrit par mon médecin oncologue ou mon médecin traitant.

Fonction hépatique : Pratiquez les bilans du foie prescrits par votre médecin. Consultez votre médecin oncologue ou infirmière coordinatrice en cas de selles pâles ou grasses, jaunisse, démangeaisons intenses, urines foncées.

Oedèmes des membres inférieurs : Surveillez régulièrement votre poids. Consultez votre médecin oncologue ou infirmière coordinatrice en cas de prise de poids rapide ou inattendue ou de gonflements des membres.

Douleurs musculaires : Consultez votre médecin oncologue ou infirmière coordinatrice en cas de douleurs importantes.

Affections cutanées : en cas de symptômes, utilisez un savon doux et un agent hydratant et contactez votre médecin. En cas d'exposition solaire, utilisez une protection (écran total) et évitez les expositions prolongées.

Pour ces symptômes, une ordonnance de soins de support adaptés vous est remise par votre médecin oncologue. Si vous ressentez des effets non mentionnés, ou si ces effets sont sévères, n'hésitez pas à contacter votre médecin, IDEC ou votre pharmacien.