

Existe-t'il des interactions médicamenteuses avec mon

Certains médicaments peuvent augmenter les effets indésirables de votre traitement ou diminuer son efficacité.

 Par conséquent, ne prenez aucun nouveau traitement (même sans ordonnance) sans avis médical.

Parmi, les médicaments contre-indiqués, on trouve :

- Les inhibiteurs ou inducteurs enzymatiques du cytochrome 3A4
- Les médicaments qui perturbent le rythme cardiaque
- Les médicaments antiacides utilisés pour soulager les aigreurs d'estomac ainsi que ceux contenant du charbon ou de l'argile pour soulager les ballonnements doivent être pris à distance de votre médicament

Une surveillance périodique sera effectuée si vous êtes sous anticoagulants en raison du risque hémorragique.

 **Pensez à donner la liste complète des médicaments, plantes ou tisanes à votre médecin ou à votre pharmacien.**

Que faire en cas d'intervention chirurgicale ?

Il faut absolument signaler que vous prenez Rydapt® avant tout geste chirurgical ou de chirurgie dentaire.

Recommandations générales



Se laver les mains avant et après chaque manipulation des comprimés.



De préférence, ramenez les boîtes de RYDAPT® entamées et les emballages vides à votre pharmacie en fin de traitement.



Protégez-vous du soleil et évitez les expositions prolongées.



RYDAPT® est contre-indiqué pendant la grossesse et l'allaitement. Si vous êtes une femme en âge de procréer, un test de grossesse doit être fait dans les 7 jours avant d'initier le traitement. Utilisez une méthode de contraception efficace pendant et jusqu'à 4 mois après l'arrêt du traitement. Si vous utilisez une méthode de contraception hormonale, ajoutez une méthode de contraception mécanique (préservatif).



Le médicament doit être conservé dans sa boîte d'origine, à une température ne dépassant pas 25°C, hors de la portée des enfants.

Contactez immédiatement le médecin en cas de :

- Difficultés à respirer ou à avaler
- Signes infectieux ou T° > 38°C
- Taux de plaquettes inférieur à 50 000/mm³ : augmentation du risque de saignements
- Taux de polynucléaires neutrophiles inférieur à 500/mm³ : augmentation du risque d'infection



CENTRE
HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE
BORDEAUX

PÔLE PRODUITS DE SANTÉ
PHARMACIE

MIDOSTAURINE – RYDAPT®

Informations à l'attention des patients



PHARMA VILLE HOP

PHARMACIE A USAGE INTERIEUR
CHU de BORDEAUX

Mail : pharmavillehop@chu-bordeaux.fr

Téléphone :

- Site Haut Lévêque : 05 57 65 64 95
- Site Saint-André : 05 57 82 25 44
- Site Pellegrin : 05 56 79 55 03



Votre médecin vous a prescrit Midostaurine RYDAPT® pour la prise en charge de votre hémopathie

Présentation et conditions de prescription

Midostaurine se présente sous la forme de capsules dosées à 25 mg. Il est prescrit par un médecin hospitalier spécialiste et est disponible uniquement en pharmacie de ville sur ordonnance. Il est nécessaire d'anticiper le renouvellement des ordonnances plusieurs jours à l'avance.

Comment agit mon médicament ?

Rydapt® est un traitement ciblé qui permet d'inhiber un signal de survie indispensable aux cellules tumorales, les protéines tyrosine-kinase.

Comment dois-je prendre mon médicament ?

Le Rydapt® se prend par voie orale avec un verre d'eau :

- au cours d'un repas,
- 2 capsules matin et soir
- en deux prises par jour à heure régulière
- à 12h d'intervalle.



Ne jamais arrêter le traitement ou modifier le rythme d'administration sans avis du prescripteur.

Les comprimés ne doivent pas être pris avec **du jus de pamplemousse** ou **d'orange amère** ni avec des produits à base de **Millepertuis**. Ils doivent être avalés entiers et ne doivent être ni écrasés, ni croqués, ni mâchés.

Que dois-je faire en cas d'oubli ou de vomissement ?

Prenez la prochaine dose au moment habituel pour garder le même rythme d'administration. Dans tous les cas, un intervalle de 12h doit être respecté entre 2 prises.

Ne jamais doubler la dose suivante dans le but de rattraper une dose manquée.

En cas de vomissements après la prise, ne reprenez pas la dose du jour et ne doublez pas la dose suivante.

Quels sont les principaux effets indésirables liés à ce traitement ?

Vous ne ressentirez pas forcément ces effets indésirables. En cas de survenue des symptômes suivants, informez votre médecin ou votre infirmière coordinatrice (IDEC).

- Signes d'infection (fièvre, frissons, toux, maux de gorge, brûlures urinaires)
- Nausées
- Troubles cardiaques (allongement de l'intervalle QT à l'électrocardiogramme, surveillance nécessaire)
- Hyperglycémie (surveillance sur la prise de sang)

Liste non exhaustive

Ce médicament provoque-t-il une chute des cheveux ?

Ce médicament ne provoque pas de chute des cheveux.

Comment prévenir et gérer la survenue de ces effets indésirables ?

- **Signes d'infection** : en prévention des infections, limitez les contacts avec les personnes infectées/contagieuses. Se laver fréquemment les mains ; désinfectez soigneusement toute plaie. Contactez votre médecin en cas de signes infectieux : fièvre > 38°C, frissons ou sueurs, toux, brûlures urinaires...
- **Troubles digestifs** :
 - En cas de nausées, vomissements : buvez entre les repas ; évitez les aliments frits, gras, épicés ; mangez lentement, faites plusieurs petits repas.

Pour ces symptômes, une ordonnance de soins de support adaptés peut vous être remise par votre médecin oncologue. Si vous ressentez des effets non mentionnés, ou si ces effets sont sévères, n'hésitez pas à contacter votre médecin, IDEC ou votre pharmacien.

Que faire en cas de déplacement ou de voyage ?

Pensez à prendre avec vous votre traitement en quantité suffisante. Pensez également à prendre votre ordonnance originale pour un éventuel renouvellement. En cas de décalage horaire, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.