

Existe-t'il des interactions médicamenteuses avec mon

Certains médicaments peuvent augmenter les effets indésirables de votre traitement ou diminuer son efficacité.



Par conséquent, ne prenez aucun nouveau traitement (même sans ordonnance) sans avis médical.

Parmi, les médicaments et aliments contre-indiqués, on trouve :

- **Pamplemousse, orange amère** (fruit, jus...)
- **Millepertuis** (infusion, tisane...)
- **Certains antibiotiques, antihypertenseurs, antifongiques, ...**
- **Médicaments qui allongent le QT**
- **Médicaments inhibiteurs du CYP3A4**
- **Certains vaccins** (dits « vivants atténués ») **sont contre-indiqués avec ce médicaments**

Une surveillance périodique sera effectuée si vous êtes sous anticoagulants en raison du risque hémorragique.



Pensez à donner la liste complète des médicaments, plantes ou tisanes à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que faire en cas de déplacement ou de voyage ?

Pensez à prendre avec vous votre traitement en quantité suffisante. Pensez également à prendre votre ordonnance originale pour un éventuel renouvellement. En cas de décalage horaire, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que faire en cas d'intervention chirurgicale ?

Il faut absolument signaler que vous prenez Quizartinib VANFLYTA® avant tout geste chirurgical ou de chirurgie dentaire (même une extraction dentaire).

Recommandations générales



Se laver les mains avant et après chaque manipulation des comprimés.



De préférence, ramenez les boîtes de Quizartinib VANFLYTA® entamées et les emballages vides à votre pharmacie en fin de traitement.



Protégez-vous du soleil et éviter les expositions prolongées.



Une contraception efficace doit être maintenue pendant le traitement. L'allaitement est contre-indiqué pendant le traitement.



Le médicament doit être conservé dans sa boîte d'origine, à une température ne dépassant pas 25°C, hors de la portée des enfants.



Ne pas consommer de pamplemousse, d'orange amères (fruit, jus...) et de produits à base de Millepertuis (tisanes, infusions...) au cours du traitement.

Contactez immédiatement le médecin en cas de :

- Difficultés à respirer ou à avaler
- Signes infectieux ou T° > 38°C



CENTRE
HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE
BORDEAUX

PÔLE PRODUITS DE SANTÉ
PHARMACIE

QUIZARTINIB – VANFLYTA®

Informations à l'attention des patients



PHARMA VILLE HOP

**PHARMACIE A USAGE INTERIEUR
CHU de BORDEAUX**

Mail : pharmavillehop@chu-bordeaux.fr

Téléphone :

☐ Site Haut Lévêque : 05 57 65 64 95

☐ Site Saint-André : 05 57 82 25 44

☐ Site Pellegrin : 05 56 79 55 03



Votre médecin vous a prescrit Quizartinib VANFLYTA® pour la prise en charge de votre hémopathie

Présentation et conditions de prescription

Quizartinib VANFLYTA® se présente sous la forme de comprimés dosés à 30 mg (ou à 20 mg). Il est prescrit par un médecin hospitalier spécialiste et est disponible dans votre pharmacie sur ordonnance. Il est nécessaire d'anticiper le renouvellement des ordonnances plusieurs jours à l'avance.

Comment agit mon médicament ?

Quizartinib VANFLYTA® est une chimiothérapie par voie orale. Il prévient la croissance des cellules leucémiques en ciblant les mécanismes nécessaires à la multiplication des cellules. Il agit spécifiquement sur une protéine mutée présente sur les cellules leucémiques : FLT3.

Comment dois-je prendre mon médicament ?

Quizartinib VANFLYTA® se prend par voie orale avec un verre d'eau :

- En une prise par jour, de préférence le matin
- Au cours ou en dehors d'un repas
- A heure régulière

La dose habituelle est de **30 mg par jour (ou 20mg par jour), soit un comprimé par jour les 15 premiers jours** du traitement. Si bonne tolérance, à partir du 16ème jour, la dose est augmentée à **60 mg par jour, soit 2 comprimés en 1 prise par jour tous les jours**.



Ne jamais arrêter le traitement ou modifier le rythme d'administration sans avis du prescripteur. La dose prescrite par votre médecin est strictement personnelle.

Les comprimés ne doivent pas être pris avec **du jus de pamplemousse** ou **d'orange amère** ni avec des produits à base de **Millepertuis**. Ils doivent être avalés entiers et ne doivent être ni écrasés, ni croqués, ni coupés, ni mâchés.

Que dois-je faire en cas d'oubli ou de vomissement ?

Si vous avez oublié une prise, **prenez la dose dès que possible le même jour dans les 6 heures qui suivent la prise habituelle**, avec un retour à l'heure habituelle le jour suivant.

Ne jamais doubler la dose suivante dans le but de rattraper une dose manquée.

En cas de vomissements après la prise, ne reprenez pas la dose du jour et ne doublez pas la dose suivante.

Quels sont les principaux effets indésirables liés à ce traitement ?

Les effets indésirables suivants sont fréquents mais non systématiques ; ils varient en fonction des personnes. En cas de survenue des symptômes suivants, informez votre médecin ou votre infirmière coordinatrice (IDEC).

- **Signes d'infection** (fièvre, frissons, toux, maux de gorge, brûlures urinaires)
- **Diarrhée**
- **Nausées, vomissements**

Vous pourriez peut-être voir sur votre prise de sang :

- **Diminution des globules rouges (anémie)**, peut être responsable d'essoufflement, de pâleur, de fatigue.
- **Augmentation des enzymes hépatiques (ALAT, ASAT)** : trouble de la fonction hépatique
- **Modification du rythme cardiaque (allongement QT)** (ECG = électrocardiogramme régulier)

Ce médicament provoque-t-il une chute des cheveux ?

Ce médicament ne provoque pas de chute des cheveux.

Comment prévenir et gérer la survenue de ces effets indésirables ?

- **Signes d'infection** : en prévention des infections, limitez les contacts avec les personnes infectées/contagieuses. Se laver fréquemment les mains ; désinfectez soigneusement toute plaie. Contactez votre médecin en cas de signes infectieux : fièvre > 38°C, frissons ou sueurs, toux, brûlures urinaires...
- **Troubles digestifs** :
 - En cas de diarrhées, évitez café, boissons glacées, lait, fruits et légumes crus, céréales, pain complet et alcool. Buvez si possible 2L par jour (eau, thé, bouillons...).
 - En cas de constipation : buvez si possible 2L d'eau par jour. Privilégiez une alimentation riche en fibres (légumes verts, fruits, fruits secs).
 - En cas de nausées, vomissements : buvez entre les repas ; évitez les aliments frits, gras, épicés ; mangez lentement, faites plusieurs petits repas.

Pour ces symptômes, une ordonnance de soins de support adaptés vous est remise par votre médecin oncologue. Si vous ressentez des effets non mentionnés, ou si ces effets sont sévères, n'hésitez pas à contacter votre médecin, IDEC ou votre pharmacien.