

Existe-t'il des interactions médicamenteuses avec mon

Certains médicaments peuvent augmenter les effets indésirables de votre traitement ou diminuer son efficacité.

 Par conséquent, ne prenez aucun nouveau traitement (même sans ordonnance) sans avis médical.

Un intervalle de 2h est recommandé entre la prise de Sonidegib ODOMZO® et :

Les médicaments utilisés pour soulager les aigreurs d'estomac (gaviscon® , Maalox® , Xolaam® , Phosphalugel® etc...)

Les médicaments contenant du charbon ou de l'argile utilisés pour soulager les ballonnements comme (carbolevure® , carbosylane® , Bedelix®)

Le millepertuis est contre-indiqué, il peut diminuer la concentration de Sonidegib ODOMZO® et diminuer ainsi son efficacité.

Le pamplemousse ainsi que les oranges amères (oranges de Séville) sont contre-indiqués, ils peuvent augmenter la concentration de Sonidegib ODOMZO® et provoquer un surdosage.

Une surveillance périodique sera effectuée si vous êtes sous anticoagulants en raison du risque hémorragique.

 **Pensez à donner la liste complète des médicaments, plantes ou tisanes à votre médecin ou à votre pharmacien.**

Que faire en cas de déplacement ou de voyage ?

Pensez à prendre avec vous votre traitement en quantité suffisante. Pensez également à prendre votre ordonnance originale pour un éventuel renouvellement. En cas de décalage horaire, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que faire en cas d'intervention chirurgicale ?

Il faut absolument signaler que vous prenez Sonidegib Odomzo® avant tout geste chirurgical ou de chirurgie dentaire (même une extraction dentaire).

Recommandations générales



Se laver les mains avant et après chaque manipulation des comprimés.



De préférence, ramenez les boîtes de Sonidegib Odomzo® entamées et les emballages vides à votre pharmacie en fin de traitement.



Protégez-vous du soleil et évitez les expositions prolongées.



Une contraception efficace doit être poursuivie pendant la durée du traitement. Il sera conseillé de poursuivre une contraception au moins 20 mois après l'arrêt du traitement par Sonidegib Odomzo® chez la femme et 6 mois chez l'homme.



Le médicament doit être conservé dans sa boîte d'origine, à une température ne dépassant pas 25°C, hors de la portée des enfants.

Contactez immédiatement le médecin en cas de :

- Signes infectieux ou T° > 38°C
- Taux de plaquettes inférieur à 50 000/mm³ : augmentation du risque de saignements
- Taux de polynucléaires neutrophiles inférieur à 500/mm³ : augmentation du risque d'infection
- Diarrhées importante avec plus de 4 selles liquides par jour : augmentation du risque de déshydratation.



PÔLE PRODUITS DE SANTÉ
PHARMACIE

Sonidegib – ODOMZO®

Informations à l'attention des patients



PHARMA VILLE HOP

PHARMACIE A USAGE INTERIEUR
CHU de BORDEAUX


Mail : pharmavillehop@chu-bordeaux.fr

Téléphone :

Site Haut Lévêque : 05 57 65 64 95

Site Saint-André : 05 57 82 25 44

Site Pellegrin : 05 56 79 55 03



Votre médecin vous a prescrit Sonidegib ODOMZO® pour la prise en charge de votre pathologie oncologique

Présentation et conditions de prescription

Sonidegib ODOMZO® se présente sous la forme de gélules dosées à 200 mg. Il est prescrit par un médecin hospitalier spécialiste et est disponible uniquement en pharmacie de ville sur ordonnance. Il est nécessaire d'anticiper le renouvellement des ordonnances plusieurs jours à l'avance.

Comment agit mon médicament ?

Sonidegib ODOMZO® empêche le développement et la croissance des cellules tumorales.

Comment dois-je prendre mon médicament ?

Sonidegib ODOMZO® se prend par voie orale avec un verre d'eau :

- Une fois par jour en continu
- En dehors des repas (une heure avant ou deux heures après)
- Au même moment de la journée

Les gélules ne doivent pas être prises avec du jus de pamplemousse ou d'orange amère ni avec des produits à base de Millepertuis. Elles doivent être avalées entières et ne doivent être ni ouvertes, ni dissoutes.



Ne jamais arrêter le traitement ou modifier le rythme d'administration sans avis du prescripteur.

Que dois-je faire en cas d'oubli ou de vomissement ?

Si vous avez oublié une prise, **si l'oubli est supérieur à 6h, attendre la prochaine prise** et ne pas prendre la dose oubliée, **si l'oubli est inférieur à 6h, prendre la dose oubliée.**

Pour éviter les oublis, vous pouvez utiliser un pilulier.

Ne jamais doubler la dose suivante dans le but de rattraper une dose manquée.

En cas de vomissements après la prise, ne reprenez pas la dose du jour et ne doublez pas la dose suivante.

Quels sont les principaux effets indésirables liés à ce traitement ?

Vous ne ressentirez pas forcément ces effets indésirables. En cas de survenue des symptômes suivants, informez votre médecin ou votre infirmière coordinatrice (IDEC).

- Troubles gastro-intestinaux : Nausées, vomissements, douleur abdominale, diarrhées, perte d'appétit, modification du goût
- Douleurs, sensibilité ou faiblesse musculaire (suivi biologique des CPK)
- Affections cutanées : rougeur de la peau, démangeaisons, assèchement de la peau
- Repro-toxicité : anomalies congénitales sévères, mort embryo-foetale (contraception obligatoire)

Vous pourriez peut-être voir sur votre prise de sang :

- Perturbation du bilan hépatique
- Diminution des globules rouges (anémie), peut être responsable d'essoufflement, de pâleur, de fatigue.

Ce médicament provoque-t-il une chute des cheveux ?

Ce médicament peut provoquer une chute des cheveux.

Comment prévenir et gérer la survenue de ces effets indésirables ?

Troubles digestifs :

- En cas de diarrhées, évitez café, boissons glacées, lait, fruits et légumes crus, céréales, pain complet et alcool. Buvez si possible 2L par jour (eau, thé, bouillons).
- En cas de constipation : buvez si possible 2L d'eau par jour. Privilégiez une alimentation riche en fibres (légumes verts, fruits, fruits secs).
- En cas de nausées, vomissements : buvez entre les repas ; évitez les aliments frits, gras, épicés ; mangez lentement, faites plusieurs petits repas.

Affections cutanées : en cas de symptômes, utilisez un savon doux et un agent hydratant et contactez votre médecin. En cas d'exposition solaire, utilisez une protection (écran total) et évitez les expositions prolongées.

Douleurs musculaires : consultez votre médecin oncologue ou infirmière coordinatrice en cas de douleurs importantes.

Contraception :

- Pour les femmes en âge de procréer : 2 méthodes de contraception recommandées pendant tout le traitement et jusqu'à 20 mois après l'arrêt du traitement. Réalisation d'un test de grossesse tous les mois.
- Pour les hommes : contraception recommandée durant toute la durée du traitement et pendant les 6 mois qui suivent l'arrêt du traitement.

Pour ces symptômes, une ordonnance de soins de support adaptés vous est remise par votre médecin oncologue. Si vous ressentez des effets non mentionnés, ou si ces effets sont sévères, n'hésitez pas à contacter votre médecin, IDEC ou votre pharmacien.