

## Existe-t'il des interactions médicamenteuses avec mon

Certains médicaments peuvent augmenter les effets indésirables de votre traitement ou diminuer son efficacité.

 Par conséquent, ne prenez aucun nouveau traitement (même sans ordonnance) sans avis médical.

Parmi, les médicaments contre-indiqués, on trouve :

- Les antivitamines K
- Les antiagrégants plaquettaires (type aspirine) peuvent augmenter le risque de saignements et doivent être utilisés avec précaution si besoin.
- Les médicaments antiacides utilisés pour soulager les aigreurs d'estomac ainsi que ceux contenant du charbon ou de l'argile pour soulager les ballonnements doivent être pris à distance de votre médicament

Une surveillance périodique sera effectuée si vous êtes sous anticoagulants en raison du risque hémorragique.

 **Pensez à donner la liste complète des médicaments, plantes ou tisanes à votre médecin ou à votre pharmacien.**

## Que faire en cas de déplacement ou de voyage ?

Pensez à prendre avec vous votre traitement en quantité suffisante. Pensez également à prendre votre ordonnance originale pour un éventuel renouvellement. En cas de décalage horaire, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

## Que faire en cas d'intervention chirurgicale ?

Il faut absolument signaler que vous prenez Tipifarnib avant tout geste chirurgical ou de chirurgie dentaire (même une extraction dentaire).

## Recommandations générales



Se laver les mains avant et après chaque manipulation des comprimés.



De préférence, ramenez les boîtes de Tipifarnib entamées et les emballages vides à votre pharmacie en fin de traitement.



Protégez-vous du soleil et évitez les expositions prolongées.



Une contraception efficace doit être poursuivie pendant la durée du traitement.



Le médicament doit être conservé dans sa boîte d'origine, à une température ne dépassant pas 25°C, hors de la portée des enfants.

## Contactez immédiatement le médecin en cas de :

- Difficultés à respirer ou à avaler
- Signes infectieux ou  $T^{\circ} > 38^{\circ}C$
- Taux de plaquettes inférieur à  $50\ 000/mm^3$  : augmentation du risque de saignements
- Taux de polynucléaires neutrophiles inférieur à  $500/mm^3$  : augmentation du risque d'infection

CHU  
BDX

CENTRE  
HOSPITALIER  
UNIVERSITAIRE  
BORDEAUX

PÔLE PRODUITS DE SANTÉ  
PHARMACIE

## TIPIFARNIB

### Informations à l'attention des patients

CHU  
BDX

PHARMA VILLE HOP

PHARMACIE A USAGE INTERIEUR  
CHU de BORDEAUX  
Mail : [pharmavillehop@chu-bordeaux.fr](mailto:pharmavillehop@chu-bordeaux.fr)  
Téléphone :

- Site Haut Lévêque : 05 57 65 64 95
- Site Saint-André : 05 57 82 25 44
- Site Pellegrin : 05 56 79 55 03



Votre médecin vous a prescrit Tipifarnib pour la prise en charge de votre pathologie tumorale

## Présentation et conditions de prescription

Tipifarnib se présente sous la forme de comprimés dosés à 300 mg. Il est prescrit par un médecin hospitalier spécialiste et est disponible uniquement à la pharmacie de l'hôpital dans le cadre d'une autorisation d'accès compationnel (AAC).

## Comment agit mon médicament ?

Tipifarnib est un traitement ciblé qui permet d'inhiber un signal de survie indispensable aux cellules cancéreuses (farnésyltransférase). Il agit spécifiquement sur une mutation appelée HRAS présente sur les cellules cancéreuses. Il empêche à la tumeur de se créer de nouveaux vaisseaux sanguins et de proliférer

## Comment dois-je prendre mon médicament ?

Tipifarnib se prend par voie orale avec un verre d'eau :

- En une prise par jour
- Lors de la prise d'un repas
- A heure fixe

Les comprimés ne doivent pas être pris avec du jus de pamplemousse ou d'orange amère ni avec des produits à base de Millepertuis. Ils doivent être avalés entiers et ne doivent être ni écrasés, ni croqués, ni coupés, ni mâchés.

La dose habituelle est de 300mg par jour soit 1 comprimé par jour. La posologie est strictement personnelle et peut-être modifiée au cours du traitement par votre médecin spécialiste.



Ne jamais arrêter le traitement ou modifier le rythme d'administration sans avis du prescripteur.

## Que dois-je faire en cas d'oubli ou de vomissement ?

Si vous avez oublié une prise, **prenez la dose dès que possible le même jour dans les 12 heures qui suivent la prise habituelle, avec un retour à l'heure habituelle le jour suivant.**

Ne jamais doubler la dose suivante dans le but de rattraper une dose manquée.

En cas de vomissements après la prise, ne reprenez pas la dose du jour et ne doublez pas la dose suivante. Si les vomissements se répètent, contactez votre médecin.

## Quels sont les principaux effets indésirables liés à ce traitement ?

Les effets indésirables suivants sont fréquents mais non systématiques, ils varient en fonction des personnes. En cas de survenue des symptômes suivants, informez votre médecin ou votre infirmière coordinatrice (IDEC).

- Infections : fièvre, frissons, toux
- Troubles gastro-intestinaux : Nausées, vomissements, douleur abdominale, diarrhées, perte d'appétit, modification du goût
- Fatigue, vertiges, maux de tête : signe d'une élévation de la pression artérielle
- Rash cutané à type d'eczéma, prurits, oedème périphérique

Vous pourriez peut-être voir sur votre prise de sang :

- Diminution des polynucléaires neutrophiles (globules blancs), peut être responsable d'infection

## Ce médicament provoque-t-il une chute des cheveux ?

Ce médicament ne provoque pas de chute des cheveux.

## Comment prévenir et gérer la survenue de ces effets indésirables ?

Signes d'infection : en prévention des infections, limitez les contacts avec les personnes infectées/contagieuses. Se laver fréquemment les mains ; désinfectez soigneusement toute plaie. Contactez votre médecin en cas de signes infectieux : fièvre > 38°C, frissons ou sueurs, toux, brûlures urinaires...

### Troubles digestifs :

- En cas de diarrhées, évitez café, boissons glacées, lait, fruits et légumes crus, céréales, pain complet et alcool. Buvez si possible 2L par jour (eau, thé, bouillons).
- En cas de constipation : buvez si possible 2L d'eau par jour. Privilégiez une alimentation riche en fibres (légumes verts, fruits, fruits secs).
- En cas de nausées, vomissements : buvez entre les repas ; évitez les aliments frits, gras, épicés ; mangez lentement, faites plusieurs petits repas.

Diminution de l'appétit : Demandez les conseils d'une diététicienne. En cas de perte de poids, parlez-en avec votre médecin.

Surveillance de ma prise de sang : je prête attention au taux de potassium, globules rouges, plaquettes et à ma fonction rénale

*Pour ces symptômes, une ordonnance de soins de support adaptés vous est remise par votre médecin oncologue. Si vous ressentez des effets non mentionnés, ou si ces effets sont sévères, n'hésitez pas à contacter votre médecin, IDEC ou votre pharmacien.*