

Existe-t'il des interactions médicamenteuses avec mon

Certains médicaments peuvent augmenter les effets indésirables de votre traitement ou diminuer son efficacité.



Par conséquent, ne prenez aucun nouveau traitement (même sans ordonnance) sans avis médical.

Attention : Ce médicament contient du lactose : en cas d'intolérance (diarrhées, ballonnements, douleurs ou crampes abdominales), prévenir votre médecin.

Un intervalle de 2h est recommandé entre la prise de Trifluridine/Tipiracil LONSURF® et :

■ Les médicaments utilisés pour soulager les aigreurs d'estomac (gaviscon® , Maalox® , Xolaam® , Phosphalugel® etc...)

■ Les médicaments contenant du charbon ou de l'argile utilisés pour soulager les ballonnements comme (carbolevure® , carbosylane® , Bedelix®)



Pensez à donner la liste complète des médicaments, plantes ou tisanes à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que faire en cas de déplacement ou de voyage ?

Pensez à prendre avec vous votre traitement en quantité suffisante. Pensez également à prendre votre ordonnance originale pour un éventuel renouvellement. En cas de décalage horaire, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que faire en cas d'intervention chirurgicale ?

Il faut absolument signaler que vous prenez Trifluridine/Tipiracil LONSURF® avant tout geste chirurgical ou de chirurgie dentaire (même une extraction dentaire).

Recommandations générales



Se laver les mains avant et après chaque manipulation des comprimés.



De préférence, ramenez les boîtes de Trifluridine/Tipiracil LONSURF® entamées et les emballages vides à votre pharmacie en fin de traitement.



Protégez-vous du soleil et évitez les expositions prolongées.



Une contraception efficace doit être poursuivie pendant la durée du traitement.



Le médicament doit être conservé dans sa boîte d'origine, à une température ne dépassant pas 25°C, hors de la portée des enfants.

Contactez immédiatement le médecin en cas de :

- Signes infectieux ou $T^{\circ} > 38^{\circ}\text{C}$
- Taux de plaquettes inférieur à $50\,000/\text{mm}^3$: augmentation du risque de saignements
- Taux de polynucléaires neutrophiles inférieur à $500/\text{mm}^3$: augmentation du risque d'infection
- Diarrhée importante avec plus de 4 selles liquides par jour : augmentation du risque de déshydratation.



CENTRE
HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE
BORDEAUX

PÔLE PRODUITS DE SANTÉ
PHARMACIE

TRIFLURIDINE / TIPIRACIL – LONSURF®

Informations à l'attention des patients



PHARMA VILLE HOP

PHARMACIE A USAGE INTERIEUR
CHU de BORDEAUX

Mail : pharmavillehop@chu-bordeaux.fr

Téléphone :

☐ Site Haut Lévyque : 05 57 65 64 95

☐ Site Saint-André : 05 57 82 25 44

☐ Site Pellegrin : 05 56 79 55 03



Votre médecin vous a prescrit
Trifluridine/Tipiracil LONSURF® pour la prise en
charge de votre pathologie oncologique

Présentation et conditions de prescription

Trifluridine/Tipiracil LONSURF® se présente sous la forme de comprimés dosés à 15 mg/6.14 mg et 20 mg/8.19 mg. Il est prescrit par un médecin hospitalier spécialiste et est disponible uniquement en pharmacie de ville sur ordonnance. Il est nécessaire d'anticiper le renouvellement des ordonnances plusieurs jours à l'avance.

Comment agit mon médicament ?

Trifluridine/Tipiracil LONSURF® ralentit le processus de multiplication anormal des cellules cancéreuses. C'est un antiprolifératif.

Comment dois-je prendre mon médicament ?

Trifluridine/Tipiracil LONSURF® se prend par voie orale avec un verre d'eau :

- Deux fois par jour selon le schéma ci-dessous
- Dans l'heure suivant la fin du repas
- Le matin et le soir

- Jour 1 au Jour 5 inclus : 2 prises par jour
- Jour 6 au jour 7 : pas de prise
- Jour 8 au jour 12 inclus : 2 prises par jour
- Jour 13 au Jour 28 : pas de prise

Trifluridine/Tipiracil LONSURF® peut être associé au bévacicumab par voie intraveineuse tous les 14 jours administré en hôpital de jour (HDJ).

Ils doivent être avalés entiers et ne doivent être ni écrasés, ni croqués, ni coupés ni mâchés.



Ne jamais arrêter le traitement ou modifier le rythme d'administration sans avis du prescripteur. Si vous avez oublié une prise, **attendre la prochaine prise et ne pas prendre la dose oubliée.**

Ne jamais doubler la dose suivante dans le but de rattraper une dose manquée.

En cas de vomissements après la prise, ne reprenez pas la dose du jour et ne doublez pas la dose suivante.

Quels sont les principaux effets indésirables liés à ce traitement ?

Vous ne ressentirez pas forcément ces effets indésirables. En cas de survenue des symptômes suivants, informez votre médecin ou votre infirmière coordinatrice (IDEC).

- Troubles gastro-intestinaux : Nausées, vomissements, douleur abdominale, diarrhées, perte d'appétit, modification du goût
- Fatigue, vertiges, maux de tête : signe d'une élévation de la pression artérielle
- Perte d'appétit
- Infections : fièvre, frissons, toux

Vous pourriez peut-être voir sur votre prise de sang :

- Diminution des polynucléaires neutrophiles (globules blancs), peut être responsable d'infection
- Diminution des globules rouges (anémie), peut être responsable d'essoufflement, de pâleur, de fatigue.
- Augmentation des enzymes hépatiques (ALAT, ASAT) : trouble de la fonction hépatique

Ce médicament provoque-t-il une chute des cheveux ?

Ce médicament ne provoque pas de chute des cheveux.

Comment prévenir et gérer la survenue de ces effets indésirables ?

• **Signes d'infection** : en prévention des infections, limitez les contacts avec les personnes infectées/contagieuses. Se laver fréquemment les mains ; désinfectez soigneusement toute plaie. Contactez votre médecin en cas de signes infectieux : fièvre > 38°C, frissons ou sueurs, toux, brûlures urinaires...

• **Faire pratiquer les bilans sanguins** (globules rouges, globules blancs et plaquettes) prescrits par votre médecin.

Pour ces symptômes, une ordonnance de soins de support adaptés vous est remise par votre médecin oncologue. Si vous ressentez des effets non mentionnés, ou si ces effets sont sévères, n'hésitez pas à contacter votre médecin, IDEC ou votre pharmacien.