

## Existe-t'il des interactions médicamenteuses avec mon

Certains médicaments peuvent augmenter les effets indésirables de votre traitement ou diminuer son efficacité.

 Par conséquent, ne prenez aucun nouveau traitement (même sans ordonnance) sans avis médical.

Parmi, les médicaments contre-indiqués, on trouve :

- Les inhibiteurs du cytochrome 3A4 ou de la protéine de transport P-gp
- Les statines peuvent être contre-indiquées ou nécessiter une surveillance clinique et biologique particulière
- Les médicaments antiacides utilisés pour soulager les aigreurs d'estomac ainsi que ceux contenant du charbon ou de l'argile pour soulager les ballonnements doivent être pris à distance de votre médicament

Une surveillance périodique sera effectuée si vous êtes sous anticoagulants en raison du risque hémorragique.

 **Pensez à donner la liste complète des médicaments, plantes ou tisanes à votre médecin ou à votre pharmacien.**

## Que faire en cas de déplacement ou de voyage ?

Pensez à prendre avec vous votre traitement en quantité suffisante. Pensez également à prendre votre ordonnance originale pour un éventuel renouvellement. En cas de décalage horaire, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

## Que faire en cas d'intervention chirurgicale ?

Il faut absolument signaler que vous prenez VENCLYXTO® avant tout geste chirurgical ou de chirurgie dentaire.

## Recommandations générales



Se laver les mains avant et après chaque manipulation des comprimés.



De préférence, ramenez les boîtes de VENCLYXTO® entamées et les emballages vides à votre pharmacie en fin de traitement.



Protégez-vous du soleil et évitez les expositions prolongées.



Venclyxto® est contre-indiqué pendant la grossesse et l'allaitement. Si vous êtes une femme en âge de procréer, utilisez une méthode de contraception efficace pendant et jusqu'à 1 mois après l'arrêt du traitement. Si vous utilisez une méthode de contraception hormonale, ajoutez une méthode de contraception mécanique (préservatif).



Le médicament doit être conservé dans sa boîte d'origine, à une température ne dépassant pas 25°C, hors de la portée des enfants.

## Contactez immédiatement le médecin en cas de :

- Difficultés à respirer ou à avaler
- Signes infectieux ou T° > 38°C
- Taux de plaquettes inférieur à 50 000/mm<sup>3</sup> : augmentation du risque de saignements
- Taux de polynucléaires neutrophiles inférieur à 500/mm<sup>3</sup> : augmentation du risque d'infection



CENTRE  
HOSPITALIER  
UNIVERSITAIRE  
BORDEAUX

PÔLE PRODUITS DE SANTÉ  
PHARMACIE

# VENETOCLAX – VENCLYXTO®

## Informations à l'attention des patients



# PHARMA VILLE HOP

PHARMACIE A USAGE INTERIEUR  
CHU de BORDEAUX  
Mail : [pharmavillehop@chu-bordeaux.fr](mailto:pharmavillehop@chu-bordeaux.fr)  
Téléphone :

- Site Haut Lévêque : 05 57 65 64 95
- Site Saint-André : 05 57 82 25 44
- Site Pellegrin : 05 56 79 55 03



Votre médecin vous a prescrit Venetoclax  
VENCLYXTO® pour la prise en charge de votre  
hémopathie

## Présentation et conditions de prescription

Vénétoclax se présente sous la forme de comprimés de formes et couleurs différentes selon le dosage (comprimé ovale jaune clair à 100 mg ; comprimé ovale beige à 50 mg ; comprimé rond jaune clair à 10 mg).

Il est prescrit par un médecin hospitalier spécialiste et est disponible en pharmacie de ville sur ordonnance, il est dans ce cas nécessaire d'anticiper le renouvellement des ordonnances plusieurs jours à l'avance.

## Comment agit mon médicament ?

Venclyxto® est un traitement ciblé qui permet d'inhiber un signal de survie indispensable aux cellules tumorales.

## Comment dois-je prendre mon médicament ?

Le vénétoclax se prend par voie orale avec un verre d'eau :

- au cours ou en dehors d'un repas,
- toujours au même moment par rapport au repas,
- en une prise par jour à heure régulière,

Il existe un schéma d'adaptation de posologie en début de traitement, avec des paliers d'augmentation sur plusieurs jours ou semaines selon l'indication.



Ne jamais arrêter le traitement ou modifier le rythme d'administration sans avis du prescripteur.

Les comprimés ne doivent pas être pris avec **du jus de pamplemousse** ou **d'orange amère** ni avec des produits à base de **Millepertuis**. Ils doivent être avalés entiers et ne doivent être ni écrasés, ni croqués, ni mâchés.

## Que dois-je faire en cas d'oubli ou de vomissement ?

Si vous avez oublié une prise, **prenez la dose dès que possible le même jour dans les 8 heures qui suivent la prise habituelle**, avec un retour à l'heure habituelle le jour suivant.

Ne jamais doubler la dose suivante dans le but de rattraper une dose manquée.

En cas de vomissements après la prise, ne reprenez pas la dose du jour et ne doublez pas la dose suivante.

## Quels sont les principaux effets indésirables liés à ce traitement ?

Vous ne ressentirez pas forcément ces effets indésirables. En cas de survenue des symptômes suivants, informez votre médecin ou votre infirmière coordinatrice (IDEC).

- Diminution des polynucléaires neutrophiles (globules blancs), peut être responsable d'infection
- Syndrome de lyse : le traitement faisant mourir les cellules malades, les marqueurs de la mort cellulaire peuvent augmenter dans le sang
- Troubles digestifs (constipation ou diarrhées)
- Fatigue

## Ce médicament provoque-t-il une chute des cheveux ?

Ce médicament ne provoque pas de chute des cheveux.

## Comment prévenir et gérer la survenue de ces effets indésirables ?

- **Signes d'infection** : en prévention des infections, limitez les contacts avec les personnes infectées/contagieuses. Se laver fréquemment les mains ; désinfectez soigneusement toute plaie. Contactez votre médecin en cas de signes infectieux : fièvre > 38°C, frissons ou sueurs, toux, brûlures urinaires...
- **Troubles digestifs** :
  - En cas de diarrhées, évitez café, boissons glacées, lait, fruits et légumes crus, céréales, pain complet et alcool. Buvez si possible 2L par jour (eau, thé, bouillons...).
  - En cas de constipation : buvez si possible 2L d'eau par jour. Privilégiez une alimentation riche en fibres (légumes verts, fruits, fruits secs).
  - En cas de nausées, vomissements : buvez entre les repas ; évitez les aliments frits, gras, épicés ; mangez lentement, faites plusieurs petits repas.
- **Fatigue, vertiges, somnolence** : la fatigue est un effet attendu. Respectez des temps de repos dans la journée, mais essayez de conserver une activité même modérée. L'effet est majoré en cas de prise d'alcool.

*Pour ces symptômes, une ordonnance de soins de support adaptés peut vous être remise par votre médecin oncologue. Si vous ressentez des effets non mentionnés, ou si ces effets sont sévères, n'hésitez pas à contacter votre médecin, IDEC ou votre pharmacien.*