

Existe-t-il des interactions médicamenteuses avec mon

Certains médicaments peuvent augmenter les effets indésirables de votre traitement ou diminuer son efficacité.

 Par conséquent, ne prenez aucun nouveau traitement (même sans ordonnance) sans avis médical.

Un intervalle de 2h est recommandé entre la prise de Adagrasib KRAZATI® et :

■ Les médicaments utilisés pour soulager les aigreurs d'estomac (gaviscon® , Maalox® , Xolaam® , Phosphalugel® etc...)

■ Les médicaments contenant du charbon ou de l'argile utilisés pour soulager les ballonnements comme (carbolevure®, carbosylane®, Bedelix®)

Le millepertuis, le pamplemousse et les oranges de Séville sont contre-indiqués.

 **Pensez à donner la liste complète des médicaments, plantes ou tisanes à votre médecin ou à votre pharmacien.**

Que faire en cas de déplacement ou de voyage ?

Pensez à prendre avec vous votre traitement en quantité suffisante. Pensez également à prendre votre ordonnance originale pour un éventuel renouvellement. En cas de décalage horaire, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que faire en cas d'intervention chirurgicale ?

Il faut absolument signaler que vous prenez Adagrasib KRAZATI® avant tout geste chirurgical ou de chirurgie dentaire (même une extraction dentaire).

Recommandations générales



Se laver les mains avant et après chaque manipulation des comprimés.



De préférence, ramenez les boîtes de Adagrasib KRAZATI® entamées et les emballages vides à votre pharmacie en fin de traitement.



Protégez-vous du soleil et évitez les expositions prolongées.



Une contraception efficace doit être poursuivie pendant la durée du traitement.



Le médicament doit être conservé dans sa boîte d'origine, à une température ne dépassant pas 25°C, hors de la portée des enfants.

Contactez immédiatement le médecin en cas de :

- Signes infectieux ou $T^{\circ} > 38^{\circ}C$
- Taux de plaquettes inférieur à $50\ 000/mm^3$: augmentation du risque de saignements
- Taux de polynucléaires neutrophiles inférieur à $500/mm^3$: augmentation du risque d'infection
- Diarrhée importante avec plus de 4 selles liquides par jour : augmentation du risque de déshydratation



CENTRE
HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE
BORDEAUX

PÔLE PRODUITS DE SANTÉ
PHARMACIE

ADAGRASIB – KRAZATI®

Informations à l'attention des patients



PHARMA VILLE HOP

**PHARMACIE A USAGE INTERIEUR
CHU de BORDEAUX**

Mail : pharmavillehop@chu-bordeaux.fr

Téléphone :

Site Haut Lévêque : 05 57 65 64 95

Site Saint-André : 05 57 82 25 44

Site Pellegrin : 05 56 79 55 03



Votre médecin vous a prescrit Adagrasib KRAZATI® pour votre pathologie oncologique

Présentation et conditions de prescription

Adagrasib KRAZATI® se présente sous la forme de comprimés dosés à 200 mg. Il est prescrit par un médecin hospitalier spécialiste et est disponible uniquement à la pharmacie de l'hôpital sur ordonnance. Il est nécessaire d'anticiper le renouvellement des ordonnances plusieurs jours à l'avance.

Comment agit mon médicament ?

Adagrasib KRAZATI® bloque la croissance des cellules cancéreuses et empêche ainsi la tumeur de proliférer.

Comment dois-je prendre mon médicament ?

Adagrasib KRAZATI® se prend par voie orale avec un verre d'eau :

- Deux fois par jour en continu
- Tous les jours
- Au même moment de la journée
- Avec ou sans nourriture

En parallèle : hospitalisation en HDJ (Hôpital de Jour) toutes les 2 semaines pour l'injection de Cétuximab.

Les comprimés doivent être avalés entiers et ne doivent être ni écrasés, ni croqués, ni coupés, ni mâchés.



Ne jamais arrêter le traitement ou modifier le rythme d'administration sans avis du prescripteur.

Que dois-je faire en cas d'oubli ou de vomissement ?

Si vous avez oublié une prise, **si l'oubli est inférieur à 4h, prendre la dose oubliée, si l'oubli est supérieur à 4h, attendre la prochaine prise, ne pas prendre la dose oubliée.**

Ne jamais doubler la dose suivante dans le but de rattraper une dose manquée.

Pour éviter les oublis, vous pouvez utiliser un pilulier.

En cas de vomissements après la prise, ne reprenez pas la dose du jour et ne doublez pas la dose suivante.

Quels sont les principaux effets indésirables liés à ce traitement ?

Vous ne ressentirez pas forcément ces effets indésirables. En cas de survenue des symptômes suivants, informez votre médecin ou votre infirmière coordinatrice (IDEC).

■ **Troubles gastro-intestinaux** : Nausées, vomissements, diarrhées, constipation, perte d'appétit, modification du goût, amaigrissement, douleurs hépatiques, modifications sur la couleur des urines et des selles.

■ **Modification du rythme cardiaque** (allongement de l'intervalle QT) -> ECG (électrocardiogramme) réguliers

■ **Infections** : fièvre, frissons, toux

Vous pourriez peut-être voir sur votre prise de sang :

■ **Augmentation des enzymes hépatiques** (Bilirubine, ALAT, ASAT) : trouble de la fonction hépatique

■ **Augmentation de la créatinine** (troubles de la fonction rénale)

■ **Diminution des polynucléaires neutrophiles** (globules blancs), peut être responsable d'infection

■ Diminution des plaquettes, peut être

responsable de saignements

■ **Diminution des globules rouges** (anémie), peut être responsable d'essoufflement, de pâleur, de fatigue.

Ce médicament provoque t'il une chute des cheveux ?

Ce médicament peut provoquer une chute des cheveux.

Comment prévenir et gérer la survenue de ces effets indésirables ?

Signes d'infection : en prévention des infections, limitez les contacts avec les personnes infectées/contagieuses. Se laver fréquemment les mains ; désinfectez soigneusement toute plaie. Contactez votre médecin en cas de signes infectieux : fièvre > 38°C, frissons ou sueurs, toux, brûlures urinaires...

Troubles digestifs :

■ En cas de diarrhées, évitez café, boissons glacées, lait, fruits et légumes crus, céréales, pain complet et alcool. Buvez si possible 2L par jour (eau, thé, bouillons).

■ En cas de constipation : buvez si possible 2L d'eau par jour. Privilégiez une alimentation riche en fibres (légumes verts, fruits, fruits secs).

■ En cas de nausées, vomissements : évitez les aliments frits, gras, épicés ; mangez lentement, faites plusieurs petits repas.

Diminution de l'appétit : Je mange plusieurs petits repas, avec des aliments que j'aime. J'emporte des collations nutritives simples à manger. Demandez les conseils d'une diététicienne. En cas de perte de poids, parlez-en avec votre médecin.

Pour ces symptômes, une ordonnance de soins de support adaptés peut vous être remise par votre médecin oncologue. Si vous ressentez des effets non mentionnés, ou si ces effets sont sévères, n'hésitez pas à contacter votre médecin, IDEC ou votre pharmacien.