

Existe t'il des interactions médicamenteuses avec mon

Certains médicaments ou plantes peuvent augmenter les effets indésirables de votre traitement ou diminuer son efficacité.



Par conséquent, ne prenez aucun nouveau traitement (même sans ordonnance) sans avis médical.

Parmi, les médicaments contre-indiqués, on trouve :

Certains vaccins (dits « vivants atténués ») sont contre-indiqués avec ce médicaments. Par conséquent, ne prenez aucun nouveau médicament (même sans ordonnance) sans avis médical.

Une surveillance périodique sera effectuée si vous êtes sous anticoagulants en raison du risque hémorragique.



Pensez à donner la liste complète des médicaments, plantes ou tisanes à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que faire en cas de déplacement ou de voyage ?

Pensez à prendre avec vous votre traitement en quantité suffisante. Pensez également à prendre votre ordonnance originale pour un éventuel renouvellement. En cas de décalage horaire, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que faire en cas d'intervention chirurgicale ?

Il faut absolument signaler que vous prenez Azacitidine Onureg® avant tout geste chirurgical ou de chirurgie dentaire.

Recommandations générales



Se laver les mains avant et après chaque manipulation des comprimés.



De préférence, ramenez les boîtes Azacitidine Onureg® entamées et les emballages vides à votre pharmacie en fin de traitement.



Protégez-vous du soleil et évitez les expositions prolongées.



Une contraception efficace doit être maintenue pendant le traitement et jusqu'à 6 mois chez les femmes et jusqu'à 3 mois pour les hommes après l'arrêt du traitement. L'allaitement est contre-indiqué pendant le traitement.



Le médicament doit être conservé dans sa boîte d'origine, à une température ne dépassant pas 25°C, hors de la portée des enfants.

Contactez immédiatement le médecin en cas de :

- Difficultés à respirer ou à avaler
- Signes infectieux ou T° > 38°C
- Taux de plaquettes inférieur à 50 000/mm³ : augmentation du risque de saignements
- Taux de polynucléaires neutrophiles inférieur à 500/mm³ : augmentation du risque d'infection



CENTRE
HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE
BORDEAUX

PÔLE PRODUITS DE SANTÉ
PHARMACIE

AZACITIDINE – ONUREG®

Informations à l'attention des patients



PHARMA VILLE HOP

**PHARMACIE A USAGE INTERIEUR
CHU de BORDEAUX**

Mail : pharmavillehop@chu-bordeaux.fr

Téléphone :

☐ **Site Haut Lévyque : 05 57 65 64 95**

☐ **Site Saint-André : 05 57 82 25 44**

☐ **Site Pellegrin : 05 56 79 55 03**



Votre médecin vous a prescrit Azacitidine ONUREG® pour la prise en charge de votre hémopathie

Présentation et conditions de prescription

Azacitidine Onureg® se présente sous la forme de comprimés dosés à 200mg ou 300 mg. Il est prescrit par un médecin spécialiste et est disponible en pharmacie de ville. Il est nécessaire d'anticiper le renouvellement des ordonnances plusieurs jours à l'avance.

Comment agit mon médicament ?

Azacitidine Onureg® est une chimiothérapie par voie orale. Il prévient la croissance des cellules leucémique en ciblant les mécanisme nécessaires à la multiplication des cellules.

Comment dois-je prendre mon médicament ?

Azacitidine Onureg® se prend par voie orale avec un verre d'eau :

- En une prise par jour
- Au cours ou en dehors d'un repas
- A heure régulière,



Ne jamais arrêter le traitement ou modifier le rythme d'administration sans avis du prescripteur.

Le traitement se déroule en plusieurs cycles de traitement de 28 jours. La dose habituelle est de **300 mg par jour, soit un comprimé par jour du 1^{er} au 14^{ème} jour suivi d'un arrêt jusqu'au 28^{ème} jour (14 jour de traitement - 14 jours de pause).**

En début de traitement, ONUREG® est associé à un antiémétique à prendre 30 min à 1 heure avant chaque prise. Cet antiémétique pourra être arrêté par la suite.

Les comprimés **doivent être avalés entiers et ne doivent être ni écrasés, ni croqués, ni mâchés.**

Que dois-je faire en cas d'oubli ou de vomissement ?

Si vous avez oublié une prise, **prenez la dose dès que possible le même jour**, avec un retour à l'heure habituelle le jour suivant.

Ne jamais doubler la dose suivante dans le but de rattraper une dose manquée.

En cas de vomissements après la prise, ne reprenez pas la dose du jour et ne doublez pas la dose suivante.

Quels sont les principaux effets indésirables liés à ce traitement ?

Vous ne ressentirez pas forcément ces effets indésirables. En cas de survenue des symptômes suivants, informez votre médecin ou votre infirmière coordinatrice (IDEC).

La maladie hématologique et l'ONUREG® augmentent le **risque d'infection**, les signes tels que **fièvre, frisson, toux...** sont à surveiller.

Des **modification de la prise de sang** (anémie, neutropénie, thrombopénie) peuvent également être observées.

Les effets indésirables suivants sont fréquents mais non systématiques, ils varient en fonction des personnes :

- Diarrhée
- Nausée/vomissement
- Diminution de l'appétit
- Fatigue
- Douleurs musculaires et articulaires

Liste non exhaustive

Ce médicament provoque-t-il une chute des cheveux ?

Ce médicament ne provoque pas de chute des cheveux.

Comment gérer et prévenir la survenue de ces effets indésirables ?

• **Signes d'infection** : en prévention des infections, limitez les contacts avec les personnes infectées/contagieuses. Se laver fréquemment les mains ; désinfectez soigneusement toute plaie. Contactez votre médecin en cas de signes infectieux : fièvre > 38°C, frissons ou sueurs, toux, brûlures urinaires...

• **Troubles digestifs** :

- En cas de diarrhées, évitez café, boissons glacées, lait, fruits et légumes crus, céréales, pain complet et alcool. Buvez si possible 2L par jour (eau, thé, bouillons...).
- En cas de constipation : buvez si possible 2L d'eau par jour. Privilégiez une alimentation riche en fibres (légumes verts, fruits, fruits secs).
- En cas de nausées, vomissements : buvez entre les repas ; évitez les aliments frits, gras, épicés ; mangez lentement, faites plusieurs petits repas.

• **Fatigue, vertige, somnolence** : la fatigue est un effet attendu. Veillez à avoir une bonne hygiène de vie (manger et boire sainement). Respectez des temps de repos dans la journée, mais essayez de conserver une activité même modérée.

Pour ces symptômes, une ordonnance de soins de support adaptés vous est remise par votre médecin oncologue. Si vous ressentez des effets non mentionnés, ou si ces effets sont sévères, n'hésitez pas à contacter votre médecin, IDEC ou votre pharmacien.