

## Existe t'il des interactions médicamenteuses avec mon traitement ?

Certains médicaments peuvent augmenter les effets indésirables de votre traitement ou diminuer son efficacité.

 Par conséquent, ne prenez aucun nouveau traitement (même sans ordonnance) sans avis médical.

Parmi, les médicaments contre-indiqués, sont :

- Traitement antiacides : à prendre à 2h de distance du Bosutinib BOSULIF®
- Certains antibiotiques, antihypertenseur
- Médicaments qui allongent le QT
- Médicaments substrats, inhibiteurs ou inducteurs du CYP3A4

 **Pensez à donner la liste complète des médicaments, plantes ou tisanes à votre médecin ou à votre pharmacien.**

## Que faire en cas de déplacement ou de voyage ?

Pensez à prendre avec vous votre traitement en quantité suffisante. Pensez également à prendre votre ordonnance originale pour un éventuel renouvellement. En cas de décalage horaire, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

## Que faire en cas d'intervention chirurgicale ?

Il faut absolument signaler que vous prenez Bosutinib BOSULIF® avant tout geste chirurgical ou de chirurgie dentaire.

## Recommandations générales



Se laver les mains avant et après chaque manipulation des comprimés.



De préférence, ramenez les boîtes de Bosutinib BOSULIF® entamées et les emballages vides à votre pharmacie en fin de traitement.



Protégez-vous du soleil et évitez les expositions prolongées.



Une contraception efficace doit être maintenue pendant le traitement. L'allaitement est contre-indiqué pendant le traitement.



Le médicament doit être conservé dans sa boîte d'origine, à une température ne dépassant pas 25°C, hors de la portée des enfants.

## Contactez immédiatement le médecin en cas de :

- Difficultés à respirer ou à avaler
- Signes infectieux ou T° > 38°C
- Taux de plaquettes inférieur à 50 000/mm<sup>3</sup> : augmentation du risque de saignements
- Taux de polynucléaires neutrophiles inférieur à 500/mm<sup>3</sup> : augmentation du risque d'infection



CENTRE  
HOSPITALIER  
UNIVERSITAIRE  
BORDEAUX

PÔLE PRODUITS DE SANTÉ  
**PHARMACIE**

## Bosutinib - BOSULIF®

## Informations à l'attention des patients



**PHARMA VILLE HOP**

**PHARMACIE A USAGE INTERIEUR  
CHU de BORDEAUX**  
Mail : [pharmavillehop@chu-bordeaux.fr](mailto:pharmavillehop@chu-bordeaux.fr)  
Téléphone :

- ☐ Site Haut Lévéque : 05 57 65 64 95
- ☐ Site Saint-André : 05 57 82 25 44
- ☐ Site Pellegrin : 05 56 79 55 03



Votre médecin vous a prescrit Bosutinib BOSULIF® pour la prise en charge de votre hémopathie en association à d'autres anti-cancéreux

## Présentation et conditions de prescription

Bosutinib BOSULIF® se présente sous la forme de comprimés dosés à 100, 400 et 500mg. Il est prescrit par un médecin hospitalier spécialiste et est disponible uniquement en pharmacie de ville sur ordonnance. Il est nécessaire d'anticiper le renouvellement des ordonnances plusieurs jours à l'avance.

## Comment agit mon médicament ?

Bosutinib BOSULIF® est une chimiothérapie par voie orale. Il cible une protéine se trouvant sur les cellules leucémique (Bcr-Abl), inhibant leur multiplication et provoquant la mort de ces cellules.

## Comment dois-je prendre mon médicament ?

Bosutinib BOSULIF® se prend par voie orale avec un verre d'eau :

- en une prise par jour à heure régulière
- **AU COURS** d'un repas
- plutôt le soir

La dose prescrite par votre médecin est strictement personnelle. Des adaptations de doses peuvent avoir lieu en fonction de la tolérance et de l'efficacité.



Ne jamais arrêter le traitement ou modifier le rythme d'administration sans avis du prescripteur.

Les comprimés ne doivent pas être pris avec **du jus de pamplemousse** ou **d'orange amère** ni avec des produits à base de **Millepertuis**. Ils doivent être avalés entiers et ne doivent être ni écrasés, ni croqués, ni mâchés.

## Que dois-je faire en cas d'oubli ou de vomissement ?

Si vous avez oublié une prise, **prenez la dose dès que possible le même jour**, avec un retour à l'heure habituelle le jour suivant.

Ne jamais doubler la dose suivante dans le but de rattraper une dose manquée.

En cas de vomissements après la prise, ne reprenez pas la dose du jour et ne doublez pas la dose suivante.

## Quels sont les principaux effets indésirables liés à ce traitement ?

Les effets indésirables suivants sont fréquents mais non systématiques ; ils varient en fonction des personnes :

- Fatigue, maux de tête
- Éruption cutanée, Prurit
- Nausées, vomissement, troubles du transit (diarrhées)
- Atteintes pulmonaires (toux, œdème)

Vous pourriez peut-être voir sur votre prise de sang :

- Thrombopénie, anémie (surveillance de la prise de sang)
- Signes d'infection (baisse des globules blancs) : fièvre, frissons, toux, maux de gorge, brûlure urinaires
- Elévation des enzymes hépatiques (ASAT, ALAT, Bilirubine...)

## Ce médicament provoque-t-il une chute des cheveux ?

Ce médicament ne provoque pas de chute des cheveux.

## Comment prévenir et gérer la survenue de ces effets indésirables ?

• **Signes d'infection** : en prévention des infections, limitez les contacts avec les personnes infectées/contagieuses. Se laver fréquemment les mains ; désinfectez soigneusement toute plaie. Contactez votre médecin en cas de signes infectieux : fièvre > 38°C, frissons ou sueurs, toux, brûlures urinaires...

### • **Troubles digestifs** :

- En cas de diarrhées, évitez café, boissons glacées, lait, fruits et légumes crus, céréales, pain complet et alcool. Buvez si possible 2L par jour (eau, thé, bouillons...).
- En cas de nausées, vomissements : buvez entre les repas ; évitez les aliments frits, gras, épicés ; mangez lentement, faites plusieurs petits repas.

- **Éruption cutanée** : en cas de symptômes, utilisez un savon doux et un agent hydratant et contactez votre médecin. En cas d'exposition solaire, utilisez une protection (écran total) et évitez les expositions prolongées.

*Pour ces symptômes, une ordonnance de soins de support adaptés peut vous être remise par votre médecin oncologue. Si vous ressentez des effets non mentionnés, ou si ces effets sont sévères, n'hésitez pas à contacter votre médecin, IDEC ou votre pharmacien.*