

Existe t'il des interactions médicamenteuses avec mon

Certains médicaments peuvent augmenter les effets indésirables de votre traitement ou diminuer son efficacité.

 Par conséquent, ne prenez aucun nouveau traitement (même sans ordonnance) sans avis médical.

Un intervalle de 2h est recommandé entre la prise de Cabozantinib CABOMETRYX® et :

- Les médicaments utilisés pour soulager les aigreurs d'estomac (Gaviscon®, Maalox®, Xolaam®, Phosphalugel®...etc)
- Les médicaments contenant du charbon ou de l'argile utilisés pour soulager les ballonnements comme (carbolevure®, carbosylane®, Bedelix®)

Le millepertuis et le pamplemousse sont contre-indiqués.

Une surveillance périodique sera effectuée si vous êtes sous anticoagulants en raison du risque hémorragique.

Ce médicament contient du lactose.

 **Pensez à donner la liste complète des médicaments, plantes ou tisanes à votre médecin ou à votre pharmacien.**

Que faire en cas de déplacement ou de voyage ?

Pensez à prendre avec vous votre traitement en quantité suffisante. Pensez également à prendre votre ordonnance originale pour un éventuel renouvellement. En cas de décalage horaire, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que faire en cas d'intervention chirurgicale ?

Il faut absolument signaler que vous prenez Cabozantinib CABOMETRYX® avant tout geste chirurgical ou de chirurgie dentaire (même une extraction dentaire).

Recommandations générales



Se laver les mains avant et après chaque manipulation des comprimés.



De préférence, ramenez les boîtes de Cabozantinib CABOMETRYX® entamées et les emballages vides à votre pharmacie en fin de traitement.



Une contraception efficace doit être poursuivie pendant le traitement.



Le médicament doit être conservé dans sa boîte d'origine, à une température ne dépassant pas 25°C, hors de la portée des enfants.

Contactez immédiatement le médecin en cas de :

- Difficultés à respirer ou à avaler
- Signes infectieux ou T° > 38°C
- Taux de plaquettes inférieur à 50 000/mm³ : augmentation du risque de saignements
- Taux de polynucléaires neutrophiles inférieur à 500/mm³ : augmentation du risque d'infection
- Si plus de 4 selles liquides par jour (diarrhée importante)



CENTRE
HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE
BORDEAUX

PÔLE PRODUITS DE SANTÉ
PHARMACIE

CABOZANTINIB – CABOMETRYX®

Informations à l'attention des patients



PHARMA VILLE HOP

PHARMACIE A USAGE INTERIEUR
CHU de BORDEAUX

Mail : pharmavillehop@chu-bordeaux.fr

Téléphone :

Site Haut Lévêque : 05 57 65 64 95

Site Saint-André : 05 57 82 25 44

Site Pellegrin : 05 56 79 55 03



Votre médecin vous a prescrit Cabozantinib CABOMETRYX® pour la prise en charge de pathologie oncologique

Présentation et conditions de prescription

Cabozantinib CABOMETRYX® se présente sous la forme de comprimés dosés à 20 mg, 40 mg et 60 mg. Il est prescrit par un médecin hospitalier spécialiste et est disponible uniquement en pharmacie de ville sur ordonnance. Il est nécessaire d'anticiper le renouvellement des ordonnances plusieurs jours à l'avance.

Comment agit mon médicament ?

Cabozantinib CABOMETRYX® empêche la tumeur de se créer de nouveaux vaisseaux sanguins et de proliférer.

Comment dois-je prendre mon médicament ?

Cabozantinib CABOMETRYX® se prend par voie orale avec un verre d'eau :

- Une heure avant ou 2 heures après par rapport au repas
- Toujours au même moment de la journée
- Une fois par jour en continu

La dose prescrite par votre médecin est strictement personnelle.



Ne jamais arrêter le traitement ou modifier le rythme d'administration sans avis du prescripteur.

Les comprimés ne doivent pas être pris avec **du jus de pamplemousse** ou **d'orange amère** ni avec des produits à base de **Millepertuis**. Ils doivent être avalés entiers et ne doivent être ni écrasés, ni croqués, ni mâchés.

Que dois-je faire en cas d'oubli ou de vomissements ?

Si l'oubli est inférieur à 12h, prendre la dose oubliée, si l'oubli est supérieur à 12h ne pas prendre la dose oubliée.

Ne jamais doubler la dose suivante dans le but de rattraper une dose manquée.

En cas de vomissements après la prise, ne reprenez pas la dose du jour et ne doublez pas la dose suivante.

Quels sont les principaux effets indésirables liés à ce traitement ?

Vous ne ressentirez pas forcément ces effets indésirables. En cas de survenue des symptômes suivants, informez votre médecin ou votre infirmière coordinatrice (IDEC).

- **Troubles gastro-intestinaux** : Nausées, vomissements, diarrhées, perte d'appétit, du goût, amaigrissement
- **Syndrome mains-pieds** : douleur, rougeur de la paume des mains et/ou de la plante des pieds, fourmillements, sécheresse cutanée
- **Plaies douloureuses dans la bouche**
- **Saignements inhabituels** (de nez, urines, selles etc...)
- **Fatigue, vertiges, maux de tête** (signes d'une élévation de la tension artérielle)
- **Fatigue, vertiges, maux de tête** (signes d'une élévation de la tension artérielle)
- **Infections** : fièvre/frissons, toux

Vous pourrez peut-être voir sur votre prise de sang :

- **Diminution des polynucléaires neutrophiles** (globules blancs), peut être responsable d'infection
- **Diminution des plaquettes**, peut être responsable de saignements
- **Diminution des globules rouges (anémie)**, peut être responsable d'essoufflement, de pâleur, de fatigue.

Ce médicament provoque-t-il une chute des cheveux ?

Ce médicament ne provoque pas de chute des cheveux.

Comment prévenir et gérer la survenue de ces effets indésirables ?

- **Eruptions cutanées (syndrome mains-pieds)** : en cas de symptômes, utilisez un savon doux et un agent hydratant et contactez votre médecin. En cas d'exposition solaire, utilisez une protection (écran total) et évitez les expositions prolongées.
- **Aphtes et mucites** : ayez une bonne hygiène bucco-dentaire, brossez-vous les dents avec une brosse à dents souple après chaque repas, suivi de bains de bouche.
- **Augmentation de la tension artérielle** : votre tension artérielle sera suivie régulièrement pour dépister une hypertension artérielle. Si nécessaire, elle sera traitée de façon appropriée. Dans le cas d'une augmentation de la tension artérielle, un traitement anti-hypertenseur pourra vous être prescrit par votre oncologue, médecin traitant ou cardiologue.

Pour ces symptômes, une ordonnance de soins de support adaptés vous est remise par votre médecin oncologue. Si vous ressentez des effets non mentionnés, ou si ces effets sont sévères, n'hésitez pas à contacter votre médecin, IDEC ou votre pharmacien.