

## Existe t'il des interactions médicamenteuses avec mon traitement ?

Certains médicaments peuvent augmenter les effets indésirables de votre traitement ou diminuer son efficacité.

 Par conséquent, ne prenez aucun nouveau traitement (même sans ordonnance) sans avis médical.

- Un intervalle de 2h est recommandé entre la prise de XALKORI® et :
  - Les médicaments utilisés pour soulager les aigreurs d'estomac (Gaviscon® ,Maalox® , Xolaam® , Phosphalugel® etc...)
  - Les médicaments contenant du charbon ou de l'argile utilisés pour soulager les ballonnements (Carbolevure® , Carbosylane®, Bedelix®)

Une surveillance périodique sera effectuée si vous êtes sous anticoagulants en raison du risque hémorragique.

 **Pensez à donner la liste complète des médicaments, plantes ou tisanes à votre médecin ou à votre pharmacien.**

## Que faire en cas de déplacement ou de voyage ?

Pensez à prendre avec vous votre traitement en quantité suffisante. Pensez également à prendre votre ordonnance originale pour un éventuel renouvellement. En cas de décalage horaire, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

## Que faire en cas d'intervention chirurgicale ?

Il faut absolument signaler que vous prenez XALKORI® avant tout geste chirurgical programmé ou urgent (même une extraction dentaire).

## Recommandations générales



Se laver les mains avant et après chaque manipulation des comprimés.



De préférence, ramenez les boîtes de XALKORI® entamées et les emballages vides à votre pharmacie en fin de traitement.



Une contraception efficace doit être poursuivie pendant la durée du traitement. Il sera conseillé de poursuivre une contraception au moins 3 mois après l'arrêt du traitement par XALKORI®.



Le médicament doit être conservé dans sa boîte d'origine, à une température ne dépassant pas 25°C, hors de la portée des enfants.

## Contactez immédiatement le médecin en cas de :

- **Signes infectieux** ou T° > 38°C
- **Taux de plaquettes inférieur à 50 000/mm<sup>3</sup>** : augmentation du risque de saignements
- **Taux de polynucléaires neutrophiles inférieur à 500/mm<sup>3</sup>** : augmentation du risque d'infection
- **Diarrhée importante** avec plus de 4 selles liquides par jour : augmentation du risque de déshydratation.

**Crizotinib – XALKORI®**  
200mg ; 250mg


## Informations à l'attention des patients



**PHARMA VILLE HOP**

PHARMACIE A USAGE INTERIEUR  
CHU de BORDEAUX  
Mail : [pharmavillehop@chu-bordeaux.fr](mailto:pharmavillehop@chu-bordeaux.fr)  
Téléphone :

- Site Haut Lévêque : 05 57 65 64 95
- Site Saint-André : 05 57 82 25 44
- Site Pellegrin : 05 56 79 55 03



Votre médecin vous a prescrit XALKORI® pour la prise en charge de votre cancer bronchique.

## Présentation et conditions de prescription

XALKORI® se présente sous la forme de gélules de 200mg et 250mg. Il est prescrit par un médecin hospitalier spécialiste et est disponible uniquement en pharmacie de ville sur ordonnance. Il est nécessaire d'anticiper le renouvellement des ordonnances plusieurs jours à l'avance.

## Comment agit mon médicament ?

XALKORI® agit spécifiquement sur une mutation appelée ALK présente sur les cellules cancéreuses et empêche le développement et la croissance des cellules tumorales.

## Comment dois-je prendre mon médicament ?

Le XALKORI se prend par voie orale avec un verre d'eau :

- au cours ou en dehors d'un repas,
- toujours au même moment par rapport au repas,
- en une prise par jour à heure régulière,
- de préférence le soir.



Ne jamais arrêter le traitement ou modifier le rythme d'administration sans avis du prescripteur.

Les gélules ne doivent pas être prises avec **du jus de pamplemousse** ou **d'orange amère** ni avec des produits à base de **Millepertuis**. Elles doivent être avalées entières et ne doivent être ni écrasées, ni croquées, ni mâchées.

## Que dois-je faire en cas d'oubli ou de vomissement ?

**Si oubli > 6h, attendre la prochaine prise**, ne pas prendre la dose oubliée.

**Si oubli < 6h, prendre la dose oubliée.**

**En cas de vomissements après la prise, ne reprenez pas la dose du jour et ne doublez pas la dose suivante.**

## Quels sont les principaux effets indésirables liés à ce traitement ?

Vous ne ressentirez pas forcément ces effets indésirables. En cas de survenue des symptômes suivants, informez votre médecin ou votre infirmière coordinatrice (IDEC).

- Troubles digestifs (diarrhées, constipation, nausées, vomissements, perte d'appétit, du goût, amaigrissement, douleurs abdominales)
- Eruptions cutanées
- Troubles de la vision
- Difficultés à respirer, toux
- Ralentissement du rythme cardiaque (gonflements ou œdèmes)

Vous pouvez peut-être voir sur votre prise de sang :

- **Diminution des polynucléaires neutrophiles** (globules blancs), peut-être responsable d'infection.
- **Diminution des plaquettes**, peut-être responsable de saignements.
- **Diminution des globules rouges (anémie)**, peut-être responsable d'essoufflement, de pâleur, de fatigue.
- **Perturbation du bilan hépatique.**

## Ce médicament provoque-t-il une chute des cheveux ?

Ce médicament ne provoque pas de chute des cheveux.

## Comment prévenir et gérer la survenue de ces effets indésirables ?

### Affections cutanées :

- Préférez un savon doux et un agent hydratant. Évitez les expositions prolongées au soleil, utilisez une protection écran total.

### En cas de troubles digestifs :

- En cas de diarrhées, évitez café, boissons glacées, lait, fruits et légumes crus, céréales, pain complet et alcool. Buvez si possible 2L par jour (eau, thé, bouillons...).
- En cas de constipation : buvez si possible 2L d'eau par jour. Privilégiez une alimentation riche en fibres (légumes verts, fruits, fruits secs).
- En cas de nausées, vomissements : buvez entre les repas ; évitez les aliments frits, gras, épicés ; mangez lentement, faites plusieurs petits repas.

**En cas de diminution de l'appétit** : Demander les conseils d'une diététicienne. En cas de perte de poids, parlez-en avec votre médecin.

**Je suis attentif à la survenue d'infections** : consulter sans attendre votre médecin traitant en cas de fièvre (température >38°C), frissons ou tout autre signe d'infection (toux, troubles respiratoires, mal de gorge, sensation de brûlures urinaires).

**Je suis attentif à ma fonction respiratoire** : en cas de survenue de difficultés à respirer, de toux persistante, contactez immédiatement votre médecin.

*Pour ces symptômes, une ordonnance de soins de support adaptés vous est remise par votre médecin oncologue. Si vous ressentez des effets non mentionnés, ou si ces effets sont sévères, n'hésitez pas à contacter votre médecin, IDEC ou votre pharmacien.*