

## Existe t'il des interactions médicamenteuses avec mon

Certains médicaments peuvent augmenter les effets indésirables de votre traitement ou diminuer son efficacité.

 Par conséquent, ne prenez aucun nouveau traitement (même sans ordonnance) sans avis médical.

Parmi, les médicaments contre-indiqués, on trouve :

- Les statines
- Les médicaments substrats des protéines OATP ou BCRP
- Les traitements contenant des cations
- Les médicaments agissant sur les protéines CYP1A2 et 2C8
- Les médicaments antiacides utilisés pour soulager les aigreurs d'estomac ainsi que ceux contenant du charbon ou de l'argile pour soulager les ballonnements doivent être pris à distance de votre médicament

 **Pensez à donner la liste complète des médicaments, plantes ou tisanes à votre médecin ou à votre pharmacien.**

## Que faire en cas de déplacement ou de voyage ?

Pensez à prendre avec vous votre traitement en quantité suffisante. Pensez également à prendre votre ordonnance originale pour un éventuel renouvellement. En cas de décalage horaire, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

## Que faire en cas d'intervention chirurgicale ?

Il faut absolument signaler que vous prenez Revolade® avant tout geste chirurgical ou de chirurgie dentaire.

## Recommandations générales



Se laver les mains avant et après chaque manipulation des comprimés.



De préférence, ramenez les boîtes de Revolade® entamées et les emballages vides à votre pharmacie en fin de traitement.



Protégez-vous du soleil et évitez les expositions prolongées.



Revolade® n'est pas recommandé pendant la grossesse et l'allaitement. Si vous êtes une femme en âge de procréer, utilisez une méthode de contraception efficace pendant le traitement. Si vous utilisez une méthode de contraception hormonale, ajoutez une méthode de contraception mécanique (préservatif).



Le médicament doit être conservé dans sa boîte d'origine, à une température ne dépassant pas 25°C, hors de la portée des enfants.

## Contactez immédiatement le médecin en cas de :

- Difficultés à respirer ou à avaler
- Signes infectieux ou T° > 38°C
- Taux de plaquettes inférieur à 50 000/mm<sup>3</sup> : augmentation du risque de saignements
- Taux de polynucléaires neutrophiles inférieur à 500/mm<sup>3</sup> : augmentation du risque d'infection



CENTRE  
HOSPITALIER  
UNIVERSITAIRE  
BORDEAUX

PÔLE PRODUITS DE SANTÉ  
PHARMACIE

## ELTROMBOPAG – REVOLADE®

## Informations à l'attention des patients



PHARMA VILLE HOP

PHARMACIE A USAGE INTERIEUR  
CHU de BORDEAUX

Mail : [pharmavillehop@chu-bordeaux.fr](mailto:pharmavillehop@chu-bordeaux.fr)

Téléphone :

Site Haut Lévêque : 05 57 65 64 95

Site Saint-André : 05 57 82 25 44

Site Pellegrin : 05 56 79 55 03



Votre médecin vous a prescrit Eltrombopag  
REVOLADE® pour la prise en charge de votre  
hémopathie

## Présentation et conditions de prescription

Eltrombopag se présente sous la forme de comprimés dosés à 25, 50, ou 75 mg. Il est prescrit par un médecin hospitalier spécialiste et est disponible uniquement en pharmacie de ville sur ordonnance. Il est nécessaire d'anticiper le renouvellement des ordonnances plusieurs jours à l'avance.

## Comment agit mon médicament ?

Revolade® est un traitement ciblé qui interagit avec une protéine qui régule la production des plaquettes, la TPO-R, permettant la production des plaquettes à partir des précurseurs de la moelle osseuse.

## Comment dois-je prendre mon médicament ?

L'eltrombopag se prend par voie orale avec un verre d'eau :

- à distance des produits laitiers
- en une prise par jour à heure régulière,

**Les éléments suivants doivent être évités dans les 4 heures précédant et suivant la prise du traitement :**

- lait et produits laitiers (fromage, beurre, yaourt, crème ...)
- médicaments antiacides
- produits contenant du calcium, aluminium, fer, magnésium, selenium, zinc ...



Ne jamais arrêter le traitement ou modifier le rythme d'administration sans avis du prescripteur.

Les comprimés ne doivent pas être pris avec **du jus de pamplemousse** ou **d'orange amère** ni avec des produits à base de **Millepertuis**. Ils doivent être avalés entiers et ne doivent être ni écrasés, ni croqués, ni mâchés.

## Que faire en cas d'oubli ou de vomissement ?

Si vous avez oublié une prise, **prenez la dose dès que possible le même jour**, avec un retour à l'heure habituelle le jour suivant.

Ne jamais doubler la dose suivante dans le but de rattraper une dose manquée.

En cas de vomissements après la prise, ne reprenez pas la dose du jour et ne doublez pas la dose suivante.

## Quels sont les principaux effets indésirables liés à ce traitement ?

Vous ne ressentirez pas forcément ces effets indésirables. En cas de survenue des symptômes suivants, informez votre médecin ou votre infirmière coordinatrice (IDEC).

- Maux de tête
- Troubles digestifs : diarrhées
- Nausées, vomissements
- Crampes, douleurs musculaires

### **Vous pourriez voir sur votre prise de sang :**

- Augmentation du nombre de plaquettes, pouvant nécessiter une adaptation de la dose de Revolade®
- Risque de caillot sanguins
- Troubles hépatiques (surveillance ASAT, ALAT, bilirubine)

## Ce médicament provoque-t-il une chute des cheveux ?

Ce médicament ne provoque pas de chute des cheveux.

## Comment prévenir et gérer la survenue de ces effets indésirables ?

### • **Troubles digestifs :**

- En cas de diarrhées, évitez café, boissons glacées, lait, fruits et légumes crus, céréales, pain complet et alcool. Buvez si possible 2L par jour (eau, thé, bouillons...).
- En cas de nausées, vomissements : buvez entre les repas ; évitez les aliments frits, gras, épicés ; mangez lentement, faites plusieurs petits repas.

• **Fatigue, vertiges, somnolence :** la fatigue est un effet attendu. Respectez des temps de repos dans la journée, mais essayez de conserver une activité même modérée. L'effet est majoré en cas de prise d'alcool.

• **Crampes, douleurs musculaires :** hydratez-vous fréquemment. Limitez, si possible, les gestes répétitifs. Si ces symptômes sont fréquents, parlez-en à votre médecin. Des compléments alimentaires à base de magnésium peuvent soulager ces symptômes.

*Pour ces symptômes, une ordonnance de soins de support adaptés peut vous être remise par votre médecin oncologue. Si vous ressentez des effets non mentionnés, ou si ces effets sont sévères, n'hésitez pas à contacter votre médecin, IDEC ou votre pharmacien.*