

Existe-t'il des interactions médicamenteuses avec mon traitement ?

Certains médicaments peuvent augmenter les effets indésirables de votre traitement ou diminuer son efficacité.



Par conséquent, ne prenez aucun nouveau traitement (même sans ordonnance) sans avis médical.

Parmi, les médicaments contre-indiqués, on trouve :

- Les antivitamines K
- Les médicaments à marges thérapeutiques étroites
- Les médicaments métabolisés par les CYP ou les OATP. L'Enasidenib est inducteur ou inhibiteur de ces enzymes selon les cas.

Rapprochez vous de votre pharmacien à chaque nouveau médicament ou compléments alimentaire.



Pensez à donner la liste complète des médicaments, plantes ou tisanes à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que faire en cas de déplacement ou de voyage ?

Pensez à prendre avec vous votre traitement en quantité suffisante. Pensez également à prendre votre ordonnance originale pour un éventuel renouvellement. En cas de décalage horaire, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que faire en cas d'intervention chirurgicale ?

Il faut absolument signaler que vous prenez Enasidenib – IDHIFA® avant tout geste chirurgical ou de chirurgie dentaire (même une extraction dentaire).

Recommandations générales



Se laver les mains avant et après chaque manipulation des comprimés.



De préférence, ramenez les boîtes d'Enasidenib – IDHIFA® entamées à votre pharmacie en fin de traitement.



Protégez-vous du soleil et évitez les expositions prolongées.



Une contraception efficace doit être poursuivie pendant la durée du traitement.



Le médicament doit être conservé dans sa boîte d'origine, à une température ne dépassant pas 25°C, hors de la portée des enfants.

Contactez immédiatement le médecin en cas de :

- Difficultés à respirer ou à avaler
- Signes infectieux ou $T^{\circ} > 38^{\circ}\text{C}$
- Taux de plaquettes inférieur à $50\ 000/\text{mm}^3$: augmentation du risque de saignements
- Taux de polynucléaires neutrophiles inférieur à $500/\text{mm}^3$: augmentation du risque d'infection



CENTRE
HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE
BORDEAUX

PÔLE PRODUITS DE SANTÉ
PHARMACIE

ENASIDENIB – IDHIFA®

Informations à l'attention des patients



PHARMA VILLE HOP



**PHARMACIE A USAGE INTERIEUR
CHU de BORDEAUX**

Mail : pharmavillehop@chu-bordeaux.fr

Téléphone :

☐ **Site Haut Lévyque : 05 57 65 64 95**

☐ **Site Saint-André : 05 57 82 25 44**

☐ **Site Pellegrin : 05 56 79 55 03**



Votre médecin vous a prescrit Enasidenib – IDHIFA® pour la prise en charge de votre Leucémie aiguë myéloïde

Présentation et conditions de prescription

Enasidenib se présente sous la forme de comprimés dosés à 50 et 100mg. Il est prescrit par un médecin hospitalier spécialiste. Il est disponible uniquement en pharmacie Hospitalière sur ordonnance. Il est nécessaire d'anticiper le renouvellement des ordonnances à l'avance.

Comment agit mon médicament ?

IDHIFA® est un traitement ciblé qui permet d'inhiber un signal de survie indispensable aux cellules leucémiques. Il agit spécifiquement sur une mutation appelée IDH2, présente sur les cellules leucémiques. Il permet la différenciation des blastes en cellules matures. Ces cellules matures passent alors dans la circulation sanguine. La réponse clinique peut apparaître à des délais variables en fonction des patients.

Comment dois-je prendre mon médicament ?

L'enasidenib se prend par voie orale avec un verre d'eau :

- au cours ou en dehors d'un repas,
- toujours au même moment par rapport au repas,
- en une prise par jour à heure régulière,
- de préférence le soir.



Ne jamais arrêter le traitement ou modifier le rythme d'administration sans avis du prescripteur.

Ils doivent être avalés entiers et ne doivent être ni écrasés, ni croqués, ni mâchés.

Les comprimés ne doivent pas être pris avec du jus de **pamplemousse** ou **d'orange amère** ni avec des produits à base de **Millepertuis**.

Que dois-je faire en cas d'oubli ou de vomissement ?

Si vous avez **oublié une prise**, prenez la dose **dès que possible le même jour**, avec un retour à l'heure habituelle le jour suivant.

Ne jamais doubler la dose suivante dans le but de rattraper une dose manquée.

En cas de vomissements après la prise, ne reprenez pas la dose du jour et ne doublez pas la dose suivante.

Quels sont les principaux effets indésirables liés à ce traitement ?

Vous ne ressentirez pas forcément ces effets indésirables. En cas de survenue des symptômes suivants, informez votre médecin ou votre infirmière coordinatrice (IDEC).

- Signes d'infection (fièvre, frissons, toux, maux de gorge, brûlures urinaires)
- Troubles digestifs (diarrhées, constipation, nausées, vomissements)
- Perte d'appétit
- Augmentation des enzymes du foie (Bilirubine)

Effets précoces particuliers :

- Syndrome de différenciation : accumulation de liquide dans le corps, œdème, prise de poids, essoufflement, difficulté à respirer ...

Ce médicament provoque-t-il une chute des cheveux ?

Ce médicament ne provoque pas de chute des cheveux.

Comment prévenir et gérer la survenue de ces effets indésirables ?

- **Signes d'infection** : en prévention des infections, limitez les contacts avec les personnes infectées/contagieuses. Se laver fréquemment les mains ; désinfectez soigneusement toute plaie. Contactez votre médecin en cas de signes infectieux : fièvre > 38°C, frissons ou sueurs, toux, brûlures urinaires...

Troubles digestifs :

- En cas de diarrhées, évitez café, boissons glacées, lait, fruits et légumes crus, céréales, pain complet et alcool. Buvez si possible 2L par jour (eau, thé, bouillons...).
- En cas de constipation : buvez si possible 2L d'eau par jour. Privilégiez une alimentation riche en fibres (légumes verts, fruits, fruits secs).
- En cas de nausées, vomissements : buvez entre les repas ; évitez les aliments frits, gras, épicés ; mangez lentement, faites plusieurs petits repas.

Crampes/douleurs musculaires : hydratez-vous fréquemment. Limitez, si possible, les gestes répétitifs. Si ces symptômes sont fréquents, parlez-en à votre médecin. Des compléments alimentaires à base de magnésiums peuvent soulager ces symptômes.

Perte d'appétit : mangez des petits repas plus souvent avec des aliments que vous aimez, emportez avec vous des collations nutritives faciles à manger.

Un diététicien est présent dans le service si besoin.

Pour ces symptômes, une ordonnance de soins de support adaptés vous est remise par votre médecin oncologue. Si vous ressentez des effets non mentionnés, ou si ces effets sont sévères, n'hésitez pas à contacter votre médecin, IDEC ou votre pharmacien.