

Existe t'il des interactions médicamenteuses avec mon

Certains médicaments peuvent augmenter les effets indésirables de votre traitement ou diminuer son efficacité.



Par conséquent, ne prenez aucun nouveau traitement (même sans ordonnance) sans avis médical.

Parmi les médicaments contre-indiqués ou nécessitant un ajustement de dose, on trouve :

- Certains antibiotiques, antifongiques ...
- Médicaments inhibiteurs du CYP3A4
- Metformine, statine
- Oméprazole

Ne pas consommer de pamplemousse, d'orange amère (fruit, jus...) , de produits à base de Millepertuis (isanes, infusion...) au cours du traitement.

Une surveillance périodique sera effectuée si vous êtes sous anticoagulants en raison du risque hémorragique.



Pensez à donner la liste complète des médicaments, plantes ou tisanes à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que faire en cas de déplacement ou de voyage ?

Pensez à prendre avec vous votre traitement en quantité suffisante. Pensez également à prendre votre ordonnance originale pour un éventuel renouvellement. En cas de décalage horaire, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que faire en cas d'intervention chirurgicale ?

Il faut absolument signaler que vous prenez Fedratinib INREBIC® avant tout geste chirurgical ou de chirurgie dentaire.

Recommandations générales



Se laver les mains avant et après chaque manipulation des comprimés.



De préférence, ramenez les boîtes de Fedratinib INREBIC® entamées et les emballages vides à votre pharmacie en fin de traitement.



Une contraception efficace doit être maintenue pendant le traitement. L'allaitement est contre-indiqué pendant le traitement.



Le médicament doit être conservé dans sa boîte d'origine, à une température ne dépassant pas 25°C, hors de la portée des enfants.

Contactez immédiatement le médecin en cas de :

- Difficultés à respirer ou à avaler
- Signes infectieux ou T° > 38°C



CENTRE
HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE
BORDEAUX

PÔLE PRODUITS DE SANTÉ
PHARMACIE

FEDRATINIB – INREBIC®

Informations à l'attention des patients



PHARMA VILLE HOP

PHARMACIE A USAGE INTERIEUR
CHU de BORDEAUX
Mail : pharmavillehop@chu-bordeaux.fr
Téléphone :

- ☐ Site Haut Lévéque : 05 57 65 64 95
- ☐ Site Saint-André : 05 57 82 25 44
- ☐ Site Pellegrin : 05 56 79 55 03



Votre médecin vous a prescrit Fedratinib INREBIC® pour la prise en charge de votre hémopathie

Présentation et conditions de prescription

Fedratinib INREBIC® se présente sous la forme de gélule dosées à 100 mg. Il est prescrit par un médecin hospitalier spécialiste et est disponible uniquement en pharmacie de ville sur ordonnance. Il est nécessaire d'anticiper le renouvellement des ordonnances plusieurs jours à l'avance.

Comment agit mon médicament ?

Fedratinib INREBIC® est une chimiothérapie par voie orale. Il prévient la croissance des cellules leucémiques en ciblant les mécanismes nécessaires à la multiplication des cellules. Il agit spécifiquement sur deux protéines mutées présentes sur les cellules leucémiques : JAK2 et FLT3.

Comment dois-je prendre mon médicament ?

Fedratinib INREBIC® se prend par voie orale avec un verre d'eau :

- En une prise par jour
- Le matin
- Au cours d'un repas riche en lipides
- A heure régulière

La dose habituelle est de **400 mg par jour soit 4 gélules par jour**. Un traitement contre les nausées et vomissements sera associé pendant les deux premiers mois de traitement.



Ne jamais arrêter le traitement ou modifier le rythme d'administration sans avis du prescripteur.

Les gélules ne doivent pas être prises avec **du jus de pamplemousse** ou **d'orange amère** ni avec des produits à base de **Millepertuis**. Elles doivent être avalées entières avec un grand verre d'eau et ne doivent être ni écrasées, ni croquées, ni mâchées.

Que dois-je faire en cas d'oubli ?

Si vous avez oublié une prise, ne prenez pas la dose manquée. La dose suivante sera prise à l'heure normale le lendemain.

Ne jamais doubler la dose suivante dans le but de rattraper une dose manquée.

En cas de vomissements après la prise, ne reprenez pas la dose du jour et ne doublez pas la dose suivante.

Quels sont les principaux effets indésirables liés à ce traitement ?

Vous ne ressentirez pas forcément ces effets indésirables. En cas de survenue des symptômes suivants, informez votre médecin ou votre infirmière coordinatrice (IDEC).

- Signes d'infection (baisse des globules blancs) : fièvre, frissons, toux, maux de gorge, brûlures urinaires
- Diarrhées
- Nausées/vomissements
- Céphalées
- Spasmes musculaires

Vous pourrez peut-être voir sur votre prise de sang :

- Anémie, neutropénie et thrombopénie (surveillance de la prise de sang)
- Augmentation des enzymes du foie (surveillance du bilan sanguin hépatique : ASAT ALAT Bilirubine)
- Augmentation de la créatinine (surveillance de la fonction rénale)
- Diminution de la vitamine B1

Liste non exhaustive

Ce médicament provoque-t-il une chute des cheveux ?

Ce médicament ne provoque pas de chute des cheveux.

Comment prévenir et gérer la survenue de ces effets indésirables ?

• **Signes d'infection** : en prévention des infections, limitez les contacts avec les personnes infectées/contagieuses. Se laver fréquemment les mains ; désinfectez soigneusement toute plaie. Contactez votre médecin en cas de signes infectieux : fièvre > 38°C, frissons ou sueurs, toux, brûlures urinaires...

• Troubles digestifs :

- En cas de diarrhées, évitez café, boissons glacées, lait, fruits et légumes crus, céréales, pain complet et alcool. Buvez si possible 2L par jour (eau, thé, bouillons...).
- En cas de constipation : buvez si possible 2L d'eau par jour. Privilégiez une alimentation riche en fibres (légumes verts, fruits, fruits secs).
- En cas de nausées, vomissements : buvez entre les repas ; évitez les aliments frits, gras, épicés ; mangez lentement, faites plusieurs petits repas.

Pour ces symptômes, une ordonnance de soins de support adaptés vous est remise par votre médecin oncologue. Si vous ressentez des effets non mentionnés, ou si ces effets sont sévères, n'hésitez pas à contacter votre médecin, IDEC ou votre pharmacien.