

Existe-t-il des interactions médicamenteuses avec mon traitement ?

Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments et avec des plantes.

Certains médicaments peuvent augmenter les effets indésirables de votre traitement ou diminuer son efficacité.



Par conséquent, ne prenez aucun nouveau traitement (même sans ordonnance) sans avis médical.

Un intervalle de 2 heures est recommandé entre la prise du Fruquitinib FRUZAQLA® et :

- Médicaments utilisés pour soulager les aigreurs d'estomac (GAVISCON®, MAALOX®, XOLAAM®, PHOSPHALUGEL®...)
- Les médicaments contenant du charbon ou de l'argile utilisés pour soulager les ballonnements (CARBOLEVURE®, CARBOSYLANE®, BEDELIX®...)

Une surveillance périodique sera effectuée si vous êtes sous anticoagulants en raison du risque hémorragique.



Pensez à donner la liste complète des médicaments, plantes ou tisanes à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que faire en cas de déplacement ou de voyage ?

Pensez à prendre avec vous votre traitement en quantité suffisante. Pensez également à prendre votre ordonnance originale pour un éventuel renouvellement. En cas de décalage horaire, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que faire en cas d'intervention chirurgicale ?

Il faut absolument signaler que vous prenez Fruquitinib FRUZAQLA® avant tout geste chirurgical ou de chirurgie dentaire (même une extraction dentaire).

Recommandations générales



Se laver les mains avant et après chaque manipulation des comprimés.



De préférence, ramenez les boîtes Fruquitinib FRUZAQLA® entamées et les emballages vides à votre pharmacie en fin de traitement.



Protégez-vous du soleil et évitez les expositions prolongées.



Une contraception efficace doit être poursuivie pendant la durée du traitement.



Le médicament doit être conservé dans sa boîte d'origine, à une température ne dépassant pas 25°C, hors de la portée des enfants.

Contactez immédiatement le médecin en cas de :

- Signes infectieux ou $T^{\circ} > 38^{\circ}\text{C}$
- Taux de plaquettes inférieur à $50\,000/\text{mm}^3$: augmentation du risque de saignements
- Taux de polynucléaires neutrophiles inférieur à $500/\text{mm}^3$: augmentation du risque d'infection
- Diarrhées importantes avec plus de 4 selles liquides par jour : augmentation du risque de déshydratation



CENTRE
HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE
BORDEAUX

PÔLE PRODUITS DE SANTÉ
PHARMACIE

**FRUQUINTINIB –
FRUZAQLA®**

Informations à l'attention des patients



PHARMA VILLE HOP

**PHARMACIE A USAGE INTERIEUR
CHU de BORDEAUX**
Mail : pharmavillehop@chu-bordeaux.fr
Téléphone :
☐ Site Haut Lévêque : 05 57 65 64 95
☐ Site Saint-André : 05 57 82 25 44
☐ Site Pellegrin : 05 56 55 64 95



Votre médecin vous a prescrit Fruquintinib FRUZAQLA® pour la prise en charge de pathologie oncologique

Présentation et conditions de prescription

Fruquintinib FRUZAQLA® se présente sous la forme de gélules dosées 5 mg et 1 mg. Il est prescrit par un médecin hospitalier spécialiste et est disponible uniquement en **pharmacie hospitalière** sur ordonnance. Il est nécessaire d'anticiper le renouvellement des ordonnances plusieurs jours à l'avance

Comment agit mon médicament ?

Fruquintinib FRUZAQLA® empêche la tumeur de se créer de nouveaux vaisseaux sanguins et de proliférer.

Comment dois-je prendre mon médicament ?

Fruquintinib FRUZAQLA® se prend par voie orale avec un verre d'eau :

- Une fois par jour pendant 21 jours, puis arrêt de 7 jours
- Toujours au même moment de la journée, à heure fixe
- Avec ou sans nourriture
- 1 cycle de traitement = 4 semaines (28 jours)



Ne jamais arrêter le traitement ou modifier le rythme d'administration sans avis du prescripteur.

Les gélules ne doivent ni être ouvertes, ni mâchées. Les gélules ne doivent pas être prises avec **du jus de pamplemousse** ou **d'orange amère** ni avec des produits à base de **Millepertuis**.

Que dois-je faire en cas d'oubli ou de vomissement ?

Si vous avez oublié une prise, **prenez la dose dès que possible le même jour dans les 12 heures qui suivent la prise habituelle**, avec un retour à l'heure habituelle le jour suivant.

Ne jamais doubler la dose suivante dans le but de rattraper une dose manquée.

En cas de vomissements après la prise, ne reprenez pas la dose du jour et ne doublez pas la dose suivante.

Quels sont les principaux effets indésirables liés à ce traitement ?

Vous ne ressentirez pas forcément ces effets indésirables. En cas de survenue des symptômes suivants, informez votre médecin ou votre infirmière coordinatrice (IDEC).

- Signes d'infection (fièvre, frissons, toux, maux de gorge, brûlures urinaires)
- Saignements inhabituels (de nez, urines, selles...)
- Troubles digestifs (diarrhées, constipation, nausées, vomissements)
- Fatigue, vertiges, somnolence
- Syndrome mains pieds (douleurs, rougeur de la paume des mains et/ou de la plante des pieds, sécheresse cutanée)

Vous pourrez peut-être voir sur votre prise de sang :

- Diminution des polynucléaires neutrophiles (globules blancs), peut être responsable d'infections
- Diminution des plaquettes, peut être responsable de saignements
- Diminution des globules rouges (anémie), peut être responsable d'essoufflement, pâleur et fatigue

Ce médicament provoque-t-il une chute des cheveux ?

Ce médicament ne provoque pas de chute des cheveux.

Comment prévenir et gérer la survenue de ces effets indésirables ?

Signes d'infection : limitez les contacts avec les personnes contagieuses. Se laver fréquemment les mains ; désinfectez soigneusement toute plaie. Contactez votre médecin en cas de signes infectieux : fièvre > 38°C, frissons ou sueurs, toux, brûlures urinaires...

Saignements inhabituels : évitez les anti-inflammatoires (aspirine, ibuprofène), les sports violents, prudence avec les objets coupants (jardinage, cuisine). En cas de saignements buccaux, préférez une brosse à dents souple. Contactez votre médecin en cas de saignements anormaux, apparition de bleus, tâches rouges...

Troubles digestifs :

- En cas de diarrhées, évitez café, boissons glacées, lait, fruits et légumes crus, céréales, pain complet et alcool. Buvez si possible 2L par jour (eau, thé...)
- En cas de constipation : buvez si possible 2L d'eau par jour. Privilégiez une alimentation riche en fibres (légumes verts, fruits, fruits secs).
- En cas de nausées, vomissements : buvez entre les repas ; évitez les aliments frits, gras, épicés ; mangez lentement, faites plusieurs petits repas.

Éruptions cutanées (syndrome mains pieds) : en cas de symptômes, utilisez un savon doux et un agent hydratant et contactez votre médecin. En cas d'exposition solaire, utilisez une protection (écran totale) et évitez les expositions prolongées.

Fatigue, vertiges, somnolence : respectez des temps de repos dans la journée, mais essayez de conserver une activité, même modérée.

Tension artérielle : votre tension artérielle sera suivie régulièrement pour dépister une hypertension artérielle. Si nécessaire, elle sera traitée de façon appropriée.

Pour ces symptômes, une ordonnance de soins de support adaptés vous est remise par votre médecin oncologue. Si vous ressentez des effets non mentionnés, ou si ces effets sont sévères, n'hésitez pas à contacter votre médecin, IDEC ou votre pharmacien.