

Existe-t'il des interactions médicamenteuses avec mon

Certains médicaments peuvent augmenter les effets indésirables de votre traitement ou diminuer son efficacité.

 Par conséquent, ne prenez aucun nouveau traitement (même sans ordonnance) sans avis médical.

Les traitements qui nécessitent des adaptations de doses ou des précautions sont :

- Les traitements inhibiteurs ou inducteurs d'une protéine, le cytochrome CYP3A4
- Les traitements qui modifient le rythme cardiaque
- Les médicaments anti-acides utilisés pour soulager les aigreurs d'estomac ainsi que ceux contenant du charbon ou de l'argile pour soulager les ballonnements doivent être pris à distance de votre médicament

Le jus de pamplemousse, les orange de Séville et le millepertuis sont contre-indiqués.

 **Pensez à donner la liste complète des médicaments, plantes ou tisanes à votre médecin ou à votre pharmacien.**

Que faire en cas de déplacement ou de voyage ?

Pensez à prendre avec vous votre traitement en quantité suffisante. Pensez également à prendre votre ordonnance originale pour un éventuel renouvellement. En cas de décalage horaire, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que dois-je faire en cas d'intervention chirurgicale ?

Il faut absolument signaler que vous prenez Tibsovo® (Ivosidénib) avant tout geste chirurgical ou de chirurgie dentaire (même une extraction dentaire).

Recommandations générales



Se laver les mains avant et après chaque manipulation des comprimés.



De préférence, ramenez les boîtes de Tibsovo® entamées et les emballages vides à votre pharmacie en fin de traitement.



Une contraception efficace doit être poursuivie pendant le traitement



Le médicament doit être conservé dans sa boîte d'origine, à une température ne dépassant pas 25°C, hors de la portée des enfants.

Contactez immédiatement le médecin en cas de :

- Difficultés à respirer ou à avaler
- Signes infectieux ou T° > 38°C
- Taux de plaquettes inférieur à 50 000/mm³ : augmentation du risque de saignements
- Taux de polynucléaires neutrophiles inférieur à 500/mm³ : augmentation du risque d'infection



CENTRE
HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE
BORDEAUX

PÔLE PRODUITS DE SANTÉ
PHARMACIE

IVOSIDENIB – TIBSOVO®

Informations à l'attention des patients



PHARMA VILLE HOP

PHARMACIE A USAGE INTERIEUR
CHU de BORDEAUX
Mail : pharmavillehop@chu-bordeaux.fr
Téléphone :

- Site Haut Lévêque : 05 57 65 64 95
- Site Saint-André : 05 57 82 25 44
- Site Pellegrin : 05 56 79 55 03



Votre médecin vous a prescrit Ivosidénib - TIBSOVO® pour la prise en charge de votre pathologie oncologique

Présentation et conditions de prescription

Tibsovo® (Ivosidénib) se présente sous la forme de comprimés dosés à 250 mg. Il est prescrit par un médecin hospitalier spécialiste et est disponible uniquement en pharmacie hospitalière. Il est nécessaire d'anticiper le renouvellement des ordonnances plusieurs jours à l'avance.

Comment agit mon médicament ?

Tibsovo® (Ivosidénib) agit **spécifiquement** sur un signal de survie présent dans les cellules cancéreuses, une mutation appelée IDH-1.

Comment dois-je prendre mon médicament ?

Tibsovo® (Ivosidénib) se prend **une fois par jour** par voie orale avec un verre d'eau :

- en dehors d'un repas,
- toujours au même moment de la journée sans nourriture ou après un repas léger, pauvre en graisses (moins de 30% de lipides),
- en une prise par jour à heure régulière,

La dose habituelle est de 500mg par jour, soit deux comprimés.

Les comprimés doivent être avalés **entiers** et **ne doivent être ni écrasés, ni croqués, ni mâchés.**



Ne jamais arrêter le traitement ou modifier le rythme d'administration sans avis du prescripteur.

Que dois-je faire en cas d'oubli ou de vomissement ?

Si vous avez oublié une prise, **si oubli > 12h, attendre la prochaine prise**, ne pas prendre la dose oubliée. **Si oubli < 12h, prendre la dose oubliée.**

Ne jamais doubler la dose suivante dans le but de rattraper une dose manquée.

En cas de vomissements après la prise, ne reprenez pas la dose du jour et ne doublez pas la dose suivante.

Quels sont les principaux effets indésirables liés à ce traitement ?

Vous ne ressentirez pas forcément ces effets indésirables. En cas de survenue des symptômes suivants, informez votre médecin ou votre infirmière coordinatrice (IDEC).

- **Troubles digestifs** : diarrhées ou constipation, nausée, perte d'appétit
- **Modification du rythme cardiaque** : allongement du rythme cardiaque, suivi par électrocardiogrammes réguliers
- **Signes d'infection** : Fièvre/frissons, toux, maux de gorge, brûlure urinaires
- **Augmentation des polynucléaires neutrophiles** (globules blancs).

Un effet indésirable précoce rare mais grave existe :

- **Syndrome de différenciation** : accumulation de liquide dans le corps, se manifeste par des œdèmes, prise de poids, essoufflement, difficulté à respirer ...

Consulter dès que possible si ces symptômes se développent.

Ce médicament provoque-t-il une chute des cheveux ?

Ce médicament ne provoque pas de chute des cheveux.

Comment prévenir certains effets indésirables ? Quand contacter rapidement le médecin ?

- **Signes d'infection** : en prévention des infections, limitez les contacts avec les personnes infectées/contagieuses. Se laver fréquemment les mains ; désinfectez soigneusement toute plaie. Contactez votre médecin en cas de signes infectieux : fièvre > 38°C, frissons ou sueurs, toux, brûlures urinaires...
- **Troubles digestifs** :
 - En cas de diarrhées : évitez café, boissons glacées, lait, fruits et légumes crus, céréales, pain complet et alcool. Buvez si possible 2L par jour (eau, thé, bouillons...).
 - En cas de constipation : buvez si possible 2L d'eau par jour. Privilégiez une alimentation riche en fibres (légumes verts, fruits, fruits secs).
 - En cas de nausées, vomissements : buvez entre les repas ; évitez les aliments frits, gras, épicés ; mangez lentement, faites plusieurs petits repas.
 - En cas de perte d'appétit : mangez plusieurs petits repas, avec des aliments que vous aimez. J'emporte des collations nutritives simples à manger. Je contacte la diététicienne du service en cas de besoin.

Pour ces symptômes, une ordonnance de soins de support adaptés peut vous être remise par votre médecin oncologue. Si vous ressentez des effets non mentionnés, ou si ces effets sont sévères, n'hésitez pas à contacter votre médecin, IDEC ou votre pharmacien.