Existe-t'il des interactions médicamenteuses avec mon

Certains médicaments ou plantes peuvent augmenter les effets indésirables de votre traitement ou diminuer son efficacité.

Par conséquent, ne prenez aucun nouveau traitement (même sans ordonnance) sans avis médical.

Une surveillance périodique sera effectuée si vous êtes sous anticoagulants en raison du risque hémorragique.

Pensez à donner la liste complète des médicaments, plantes ou tisanes à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que faire en cas de déplacement ou de voyage ?

Pensez à prendre avec vous votre traitement en quantité suffisante. Pensez également à prendre votre ordonnance originale pour un éventuel renouvellement. En cas de décalage horaire, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.


Que faire en cas d'intervention chirurgicale ?

Il faut absolument signaler que vous prenez Olaparib LYNPARZA® avant tout geste chirurgical ou de chirurgie dentaire (même une extraction dentaire). En cas de geste chirurgical programmé, une suspension du traitement avant et après l'acte chirurgical pourra être envisagée.

Recommandations générales



Se laver les mains avant et après chaque manipulation des comprimés.





Le médicament doit être conservé dans sa boîte d'origine, à une température ne dépassant pas 25°C. Ne pas laisser les comprimés à la portée des enfants.

Ce médicament contient du **lactose** : En cas d'intolérance (diarrhées, ballonnements, douleurs ou crampes abdominales), prévenir votre médecin.

Contactez immédiatement le médecin en cas de :

- Difficultés à respirer ou à avaler
- Signes infectieux ou T°> 38°C
- Taux de plaquettes inférieur à 50 000/mm³ : augmentation du risque de saignements
- Taux de polynucléaires neutrophiles inférieur à 500/mm³: augmentation du risque d'infection



PÔLE PRODUITS DE SANTÉ PHARMACIE

OLAPARIB - LYNPARZA®

Informations à l'attention des patients



PHARMACIE A USAGE INTERIEUR
CHU de BORDEAUX

Mail: pharmavillehop@chu-bordeaux.fr

Téléphone :

☐ Site Haut Lévêque : 05 57 65 64 95
 ☐ Site Saint-André : 05 57 82 25 44
 ☐ Site Pellegrin : 05 56 79 55 03



Votre médecin vous a prescrit Olaparib LYNPARZA® pour la prise en charge de votre pathologie oncologique

Présentation et conditions de prescription

Olaparib LYNPARZA® se présente sous la forme de comprimés dosés à 100 mg et 150 mg. Il est prescrit par un médecin hospitalier spécialiste et est disponible en pharmacie de ville sur ordonnance. Il est nécessaire d'anticiper le renouvellement des ordonnances plusieurs jours à l'avance.

Comment agit mon médicament ?

Olaparib LYNPARZA® bloque la croissance des cellules tumorales et empêche la tumeur de proliférer.

Comment dois-je prendre mon médicament ?

Olaparib LYNPARZA® se prend par voie orale avec un verre d'eau :

- Tous les jours
- toujours au même moment de la journée

La posologie est adaptée à votre maladie et les doses prescrites doivent être respectées.

- 300 mg matin et soir : 2 comprimées de 150 mg matin et soir soit une dose totale de 600 mg
- 250 mg matin et soir : 1 comprimé de 150 mg + 1 comprimé de 100 mg matin et soir soit une dose totale de 500 mg
- 200 mg matin et soir : 2 comprimés de 100 mg matin et soir soit une dose totale de 400 mg
- 150 mg matin et soir : 1 comprimé de 150 mg matin et soir soit une dose totale de 300 mg
- 100 mg matin et soir : 1 comprimés de 100 mg matin et soir soit une dose totale de 200 mg

We jamais arrêter le traitement ou modifier le rythme d'administration sans avis du prescripteur.

Les comprimés ne doivent pas être pris avec <u>du jus</u> <u>de pamplemousse</u> ou <u>d'orange amère</u> ni avec des produits à base de <u>Millepertuis</u>. Ils doivent être avalés entiers et ne doivent être ni écrasés, ni croqués, ni mâchés.

Ce médicament provoque-t-il une chute des cheveux ?

Si vous avez oublié une prise, attendre la prochaine prise avec un retour à l'heure habituelle le jour suivant.

Ne jamais doubler la dose suivante dans le but de rattraper une dose manquée.

En cas de vomissements après la prise, ne reprenez pas la dose du jour et ne doublez pas la dose suivante.

Quels sont les principaux effets indésirables liés à ce traitement ?

Vous ne ressentirez pas forcément ces effets indésirables. En cas de survenue des symptômes suivants, informez votre médecin ou votre infirmière coordinatrice (IDEC).

- Fatigue
- Baisse de l'appétit, modification du goût
- Céphalées sensations vertigineuses
- Nausées, vomissements, diarrhées
- Diarrhées
- Fièvre, épisode infectieux
- Inflammation de la bouche
- Hématologie : Pâleur (anémie, baisse des globules rouges) saignement (diminution des plaquettes
- Éruptions cutanées type acné (démangeaisons, rougeurs)
- Toux sèche, difficultés respiratoires

Ce médicament provoque-t-il une chute des cheveux ?

Ce médicament ne provoque pas de chute des cheveux.

Comment prévenir et gérer la survenue de ces effets indésirables ?

- <u>Signes d'infection</u>: en prévention des infections, limitez les contacts avec les personnes infectées/contagieuses. Se laver fréquemment les mains ; désinfectez soigneusement toute plaie. Contactez votre médecin en cas de signes infectieux : fièvre > 38°C, frissons ou sueurs, toux, brûlures urinaires...
- Aphtes et mucites: Ayez une bonne hygiène bucco-dentaire, brossez-vous les dents avec une brosse à dents souple après chaque repas, suivi de bains de bouche.
- <u>Saignements inhabituel</u>: Evitez les médicaments anti-inflammatoires: aspirine, ibuprofène... En cas de saignements buccaux, préférez une brosse à dents souple. En cas de saignements anormaux, apparition de bleus, tâches rouges sur la peau... Contactez votre médecin.
- <u>Diminution de l'appétit</u>: demander les conseils d'une diététicienne.

Pour ces symptômes, une ordonnance de soins de support adaptés vous est remise par votre médecin oncologue. Si vous ressentez des effets non mentionnés, ou si ces effets sont sévères, n'hésitez pas à contacter votre médecin, IDEC ou votre pharmacien.