

Existe-t'il des interactions médicamenteuses avec mon

Certains médicaments peuvent augmenter les effets indésirables de votre traitement ou diminuer son efficacité.

 Par conséquent, ne prenez aucun nouveau traitement (même sans ordonnance) sans avis médical.

Un intervalle de 2h est recommandé entre la prise de Pémigatinib Pemazyre® et :

- Les médicaments utilisés pour **soulager les aigreurs d'estomac** (Gaviscon®, Maalox®, Xolaam®, Phosphalugel® etc...)
- Les médicaments contenant du charbon ou de l'argile utilisés pour **soulager les ballonnements** (carbolevure®, carbosylane®, Bedelix®)

Le pamplemousse, les orange de Séville et le millepertuis sont contre-indiqués

Une surveillance périodique sera effectuée si vous êtes sous anticoagulants en raison du risque hémorragique.

 **Pensez à donner la liste complète des médicaments, plantes ou tisanes à votre médecin ou à votre pharmacien.**

Que faire en cas de déplacement ou de voyage ?

Pensez à prendre avec vous votre traitement en quantité suffisante. Pensez également à prendre votre ordonnance originale pour un éventuel renouvellement. En cas de décalage horaire, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que faire en cas d'intervention chirurgicale ?

Il faut absolument signaler que vous prenez Pémigatinib Pemazyre® avant tout geste chirurgical ou de chirurgie dentaire (même pour une extraction dentaire).

Recommandations générales



Se laver les mains avant et après chaque manipulation des comprimés.



De préférence, ramenez les boîtes entamées de Pémigatinib Pemazyre® et les emballages vides à votre pharmacie en fin de traitement.



Une contraception efficace doit être poursuivie pendant le traitement



Le médicament doit être conservé dans sa boîte d'origine, à une température ne dépassant pas 25°C, hors de la portée des enfants.

Contactez immédiatement le médecin en cas de :

- **Signes infectieux ou T° > 38°C**
- Taux de plaquettes inférieur à 50 000/mm³ : augmentation du risque de saignements
- Taux de polynucléaires neutrophiles inférieur à 500/mm³ : augmentation du risque d'infection
- Diarrhée importante avec plus de 4 selles liquides par jour : augmentation du risque de déshydratation



CENTRE
HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE
BORDEAUX

PÔLE PRODUITS DE SANTÉ
PHARMACIE

Pémigatinib – PEMAZYRE®

Informations à l'attention des patients



PHARMA VILLE HOP

PHARMACIE A USAGE INTERIEUR
CHU de BORDEAUX

Mail : pharmavillehop@chu-bordeaux.fr

Téléphone :

Site Haut Lévêque : 05 57 65 64 95

Site Saint-André : 05 57 82 25 44

Site Pellegrin : 05 56 79 55 03



Votre médecin vous a prescrit Pémigatinib PEMAZYRE® pour la prise en charge de votre pathologie oncologique

Présentation et conditions de prescription

Pémigatinib Pemazyre® se présente sous la forme de comprimés dosés à 13.5 mg, 9 mg ou 4.5 mg. Il est prescrit par un médecin hospitalier spécialiste et est disponible uniquement en à la pharmacie de l'hôpital sur ordonnance. Il est nécessaire d'anticiper le renouvellement des ordonnances plusieurs jours à l'avance.

Comment agit mon médicament ?

Pémigatinib Pemazyre® bloque la croissance des cellules cancéreuses et empêche ainsi la tumeur de proliférer.

Comment dois-je prendre mon médicament ?

Pémigatinib Pemazyre® se prend par voie orale avec un verre d'eau :

- Une prise par jour
- Au cours et en dehors des repas
- A heure régulière

Pémigatinib Pemazyre® se prend en une fois par jour pendant 14 jours, suivi de 7 jours d'arrêt de traitement.



Ne jamais arrêter le traitement ou modifier le rythme d'administration sans avis du prescripteur.

Les comprimés ne doivent pas être prises avec **du jus de pamplemousse** ou **d'orange amère** ni avec des produits à base de **Millepertuis**. **Ils doivent être avalés entiers et ne doivent être ni écrasés, ni croqués, ni mâchés.**

Que dois-je faire en cas d'oubli ou de vomissement ?

Si vous avez oublié une prise, **si l'oubli est < à 4h , prendre la dose oubliée. Si l'oubli est > à 4h, attendre la prochaine prise.**

Ne jamais doubler la dose suivante dans le but de rattraper une dose manquée.

En cas de vomissements après la prise, ne reprenez pas la dose du jour et ne doublez pas la dose suivante.

Quels sont les principaux effets indésirables liés à ce traitement ?

Vous ne ressentirez pas forcément ces effets indésirables. En cas de survenue des symptômes suivants, informez votre médecin ou votre infirmière coordinatrice (IDEC).

- Troubles gastro-intestinaux
 - Nausées,
 - Diarrhées, constipation,
 - Perte d'appétit, du goût, amaigrissement
- Syndrome mains-pieds
 - Douleur, rougeur de la paume des mains et/ou de la plante des pieds
 - Fourmillements
 - Sécheresse cutanée
- Plaies douloureuses de la bouche (aphtes, mucites)
- Affection oculaire (sécheresse oculaire, diminution de l'acuité visuelle)
- Fatigue, arthralgies, augmentation de la pilosité
- Atteinte au niveau des ongles (cassures, décoloration)

Vous pouvez peut-être voir sur votre prise de sang :

- Augmentation ou diminution du taux de phosphates
- Augmentation de la créatinine (troubles de la fonction rénale)
- Diminution du taux de sodium (maux de tête, nausées, confusion)

Ce médicament provoque-t-il une chute des cheveux ?

Ce médicament peut provoquer une chute des cheveux.

Comment prévenir et gérer la survenue de ces effets indésirables ?

Je prends des précautions pour éviter le syndrome main-pied :

- Quotidiennement, appliquez des **crèmes sans parfum hydratantes** pour peaux très sèches sur les zones atteintes.
- J'évite l'exposition des mains et des pieds à la chaleur ou au froid intense.
- Je prends des précautions pour éviter aphtes et mucites : J'ai une bonne hygiène bucco-dentaire : je me brosse les dents avec une brosse à dents souple après chaque repas suivi de **bains de bouche**.
- Ma vue sera suivie régulièrement pour dépister une affection oculaire et si nécessaire traitée de façon appropriée. Une adaptation de mon traitement sera faite en cas de besoin.

Pour ces symptômes, une ordonnance de soins de support adaptés vous est remise par votre médecin oncologue. Si vous ressentez des effets non mentionnés, ou si ces effets sont sévères, n'hésitez pas à contacter votre médecin, IDEC ou votre pharmacien.