

Pour ces symptômes, une ordonnance de soins de support adaptés peut vous être remise par votre médecin oncologue. Si vous ressentez des effets non mentionnés, ou si ces effets sont sévères, n'hésitez pas à contacter votre médecin, IDEC ou votre pharmacien.

Existe-t-il des interactions médicamenteuses avec mon

Certains médicaments ou plantes peuvent augmenter les effets indésirables de votre traitement ou diminuer son efficacité.

 Par conséquent, ne prenez aucun nouveau traitement (même sans ordonnance) sans avis médical.

A l'attention des professionnels de santé qui vous prennent en charge :

- Les inhibiteurs puissants du CYP3A4 et 2C9 nécessitent une adaptation posologique du traitement par Jakavi® (ruxolitinib)
- Les inhibiteurs modérés du CYP3A4 et 2C9 nécessitent une surveillance accrue du traitement voir une diminution de dose du Jakavi® (ruxolitinib)
- Les médicaments à marge thérapeutique étroite et transportés par les p-gP : digoxine, ciclosporine, dabigatran, rosuvastatine peuvent être déséquilibrés par l'ajout du Jakavi® (ruxolitinib)

 **Pensez à donner la liste complète des médicaments, plantes ou tisanes à votre médecin ou à votre pharmacien.**

Que faire en cas de déplacement ou de voyage ?

Pensez à prendre avec vous votre traitement en quantité suffisante. Pensez également à prendre votre ordonnance originale pour un éventuel renouvellement. En cas de décalage horaire, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que faire en cas d'intervention chirurgicale ?

Il faut absolument signaler que vous prenez Jakavi® (ruxolitinib) avant tout geste chirurgical ou de chirurgie dentaire.

Recommandations générales



Se laver les mains avant et après chaque manipulation des comprimés.



De préférence, ramenez les boîtes Jakavi® (ruxolitinib) entamées et les emballages vides à votre pharmacie en fin de traitement.



Protégez-vous du soleil et évitez les expositions prolongées.



Jakavi® (ruxolitinib) est **contre-indiqué pendant la grossesse et l'allaitement**. Si vous êtes une femme en âge de procréer, une **contraception efficace** doit être mise en place pendant toute la durée du traitement.



Le médicament doit être conservé dans sa boîte d'origine, à une température ne dépassant pas 25°C, hors de la portée des enfants.

Contactez immédiatement le médecin en cas de :

- **Signes infectieux** ou T° > 38°C (frissons, fièvre, toux...)
- **Saignements anormaux** (sang dans les selles/urines, saignements de nez, crachant comportant du sang)
- **Difficultés à respirer, douleur thoracique, gonflements, rougeurs, douleurs au niveau des bras/jambes**



CENTRE
HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE
BORDEAUX

PÔLE PRODUITS DE SANTÉ
PHARMACIE

RUXOLITINIB – JAKAVI®

Informations à l'attention des patients



PHARMA VILLE HOP

PHARMACIE A USAGE INTERIEUR
CHU de BORDEAUX
Mail : pharmavillehop@chu-bordeaux.fr
Téléphone :

- ☐ Site Haut Lévêque : 05 57 65 64 95
- ☐ Site Saint-André : 05 57 82 25 44
- ☐ Site Pellegrin : 05 56 79 55 03



Votre médecin vous a prescrit Jakavi® (ruxolitinib) pour la prise en charge de votre hémopathie

Présentation et conditions de prescription

Jakavi® (ruxolitinib) se présente sous la forme de comprimés blancs dosés à 5, 10, 15 ou 20 mg. Il est prescrit par un médecin spécialiste et est disponible uniquement en pharmacie de ville sur ordonnance. Il est nécessaire d'anticiper le renouvellement des ordonnances plusieurs jours à l'avance.

Comment agit mon médicament ?

Jakavi® (ruxolitinib) agit de manière ciblée sur une molécule appelée JAK en inhibant son action. En agissant sur le JAK, le Jakavi® (ruxolitinib) permet de diminuer la prolifération cellulaire.

Comment dois-je prendre mon médicament ?

Jakavi® (ruxolitinib) se prend par voie orale avec un verre d'eau :

- au cours ou en dehors d'un repas,
- en deux prises par jour
- A heure régulière



Ne jamais arrêter le traitement ou modifier le rythme d'administration sans avis du prescripteur.

Les comprimés ne doivent pas être pris avec **du jus de pamplemousse** ou **d'orange amère** ni avec des produits à base de **Millepertuis**. Ils doivent être **avalés entiers et ne doivent être ni écrasés, ni croqués, ni mâchés**.

La posologie est strictement personnelle et peut-être modifiée au cours du traitement par votre médecin spécialiste.

Que dois-je faire en cas d'oubli ou de vomissement ?

Si vous avez oublié une prise, **ne prenez pas la dose manquée**. La dose suivante sera prise à l'heure habituelle.

Ne jamais doubler la dose suivante dans le but de rattraper une dose manquée.

En cas de vomissements après la prise, **ne reprenez pas la dose du jour et ne doublez pas la dose suivante**.

Quels sont les principaux effets indésirables liés à ce traitement ?

Les effets indésirables suivants sont fréquents mais non systématiques, ils varient en fonction des personnes. En cas de survenue des symptômes suivants, informez votre médecin ou votre infirmière coordinatrice (IDEC).

- Signes d'infection (fièvre, frissons, toux, maux de gorge, brûlures urinaires)
- Saignements inhabituels : bleus, saignements des gencives ...
- Troubles digestifs (diarrhées, constipation, nausées, vomissements)
- Perturbation du bilan hépatique
- Maux de tête, fatigue, vertiges, somnolence

Liste non exhaustive

Ce médicament provoque-t-il une chute des cheveux ?

Ce médicament ne provoque pas de chute des cheveux.

Comment prévenir et gérer la survenue de ces effets indésirables ?

- **Signes d'infection** : en prévention des infections, limitez les contacts avec les personnes infectées/contagieuses. Se laver fréquemment les mains ; désinfectez soigneusement toute plaie. **Contactez votre médecin en cas de signes infectieux : fièvre > 38°C, frissons ou sueurs, toux, brûlures urinaires...**
- **Saignements inhabituels** : évitez les anti-inflammatoires (aspirine, ibuprofène), les sports violents, prudence avec les objets coupants (jardinage, cuisine). En cas de saignements buccaux, préférez une brosse à dents souple. **Contactez votre médecin en cas de saignements anormaux, apparition de bleus, tâches rouges sur la peau...**
- **Troubles digestifs** :
 - En cas de diarrhées, évitez café, boissons glacées, lait, fruits et légumes crus, céréales, pain complet et alcool. Buvez si possible 2L par jour (eau, thé, bouillons...).
 - En cas de constipation : buvez si possible 2L d'eau par jour. Privilégiez une alimentation riche en fibres (légumes verts, fruits, fruits secs).
 - En cas de nausées, vomissements : buvez entre les repas ; évitez les aliments frits, gras, épicés ; mangez lentement, faites plusieurs petits repas.
- **Fatigue, vertige, somnolence** : la fatigue est un effet attendu. Veillez à avoir une bonne hygiène de vie (manger et boire sainement). Respectez des temps de repos dans la journée, mais essayez de conserver une activité même modérée.