

Existe-t-il des interactions médicamenteuses avec mon

Certains médicaments ou plantes peuvent augmenter les effets indésirables de votre traitement ou diminuer son efficacité.



Par conséquent, ne prenez aucun nouveau traitement (même sans ordonnance) sans avis médical.

Un intervalle de 2h est recommandé entre la prise de Riprétinib **QINLOCK®** et :

- Les médicaments utilisés pour **soulager les aigreurs d'estomac** (Gaviscon®, Maalox®, Xolaam®, Phosphalugel® etc...)
- Les médicaments contenant du charbon ou de l'argile utilisés pour **soulager les ballonnements** (carbolevure®, carbosylane®, Bedelix®)

Le millepertuis, le pamplemousse et les oranges sanguines de Séville sont contre-indiqués.

ATTENTION CE MEDICAMENT CONTIENT DU LACTOSE

Une surveillance périodique sera effectuée si vous êtes sous anticoagulants en raison du risque hémorragique.



Pensez à donner la liste complète des médicaments, plantes ou tisanes à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que faire en cas de déplacement ou de voyage ?

Pensez à prendre avec vous votre traitement en quantité suffisante. Pensez également à prendre votre ordonnance originale pour un éventuel renouvellement. En cas de décalage horaire, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que faire en cas d'intervention chirurgicale ?

Il faut absolument signaler que vous prenez Riprétinib **QINLOCK®** avant tout geste chirurgical ou de chirurgie dentaire (même pour une extraction dentaire). En cas de geste chirurgical programmé, Riprétinib **QINLOCK®** doit être arrêté 3 à 7 jours avant selon le geste envisagé.

Recommandations générales



Se laver les mains avant et après chaque manipulation des comprimés.



De préférence, ramenez les boîtes de Riprétinib **QINLOCK®** entamées et les emballages vides à votre pharmacie en fin de traitement.



Une contraception efficace doit être poursuivie pendant le traitement.



Protégez-vous du soleil et évitez les expositions prolongées.



Le médicament doit être conservé dans sa boîte d'origine, à une température ne dépassant pas 25°C, hors de la portée des enfants.

Contactez immédiatement le médecin en cas de :

- **Signes infectieux** ou $T^{\circ} > 38^{\circ}\text{C}$
- **Taux de plaquettes inférieur à 50 000/mm³** : augmentation du risque de saignements
- **Taux de polynucléaires neutrophiles inférieur à 500/mm³** : augmentation du risque d'infection
- **Diarrhée importante** avec plus de 4 selles liquides par jour : augmentation du risque de déshydratation



CENTRE
HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE
BORDEAUX

PÔLE PRODUITS DE SANTÉ
PHARMACIE

RIPRETINIB – QINLOCK®

Informations à l'attention des patients



PHARMA VILLE HOP

**PHARMACIE A USAGE INTERIEUR
CHU de BORDEAUX**

Mail : pharmavillehop@chu-bordeaux.fr

Téléphone :

☐ Site Haut Lévêque : 05 57 65 64 95

☐ Site Saint-André : 05 57 82 25 44

☐ Site Pellegrin : 05 56 79 55 03



Votre médecin vous a prescrit Riprétinib
QINLOCK® pour la prise en charge de votre
hémopathie

Présentation et conditions de prescription

Riprétinib QINLOCK® se présente sous la forme de comprimés dosés à 50 mg. Il est prescrit par un médecin hospitalier spécialiste hospitalier et est disponible uniquement à la pharmacie de hôpital sur ordonnance. Il est nécessaire d'anticiper le renouvellement des ordonnances plusieurs jours à l'avance.

Comment agit mon médicament ?

Riprétinib QINLOCK® empêche la tumeur de se créer de nouveaux vaisseaux sanguins et de proliférer.

Comment dois-je prendre mon médicament ?

Riprétinib QINLOCK® se prend par voie orale avec un verre d'eau :

- Une fois par jour en continu
- Au court ou en dehors des repas
- Au même moment de la journée



Ne jamais arrêter le traitement ou modifier le rythme d'administration sans avis du prescripteur.

Les comprimés ne doivent pas être pris avec **du jus de pamplemousse** ou **d'orange amère** ni avec des produits à base de **Millepertuis**. Ils doivent être avalés entiers et ne doivent être ni écrasés, ni croqués, ni mâchés.

Que dois-je faire en cas d'oubli ou de vomissement ?

Si vous avez oublié une prise, **si l'oubli est > à 8h, prendre la dose oubliée, si l'oubli est > attendre la prochaine prise.**

Ne jamais doubler la dose suivante dans le but de rattraper une dose manquée.

En cas de vomissements après la prise, ne reprenez pas la dose du jour et ne doublez pas la dose suivante.

Quels sont les principaux effets indésirables liés à ce traitement ?

Vous ne ressentirez pas forcément ces effets indésirables. En cas de survenue des symptômes suivants, informez votre médecin ou votre infirmière coordinatrice (IDEC).

- **Troubles gastro-intestinaux :**
 - Nausées, vomissements
 - Diarrhées ou constipation
 - Perte d'appétit, amaigrissement
- **Syndrome mains-pieds :**
 - Douleurs, rougeur de la paume des mains et/ou de la plante des pieds
 - Fourmillements
 - Sécheresse cutanée, démangeaisons
- **Douleurs musculaires ou articulaires**
- **Essoufflement, gonflement des pieds et/ou des chevilles** (signes d'une insuffisance cardiaque)
- **Troubles cutanées :**
 - Apparition de grains de beauté ressemblant à des verrues, inexistants avant le début du traitement
- **Fatigue, vertiges, maux de tête** (signes d'une élévation de la pression artérielle)

Vous pourriez peut-être voir sur votre prise de sang :

- **Diminution des globules rouges** (anémie), peut être responsable d'essoufflement, de pâleur, de fatigue
- **Diminution des phosphates dans le sang**
- **Augmentation de la lipasémie ou de la bilirubine**

Ce médicament provoque-t-il une chute des cheveux ?

Ce médicament peut provoquer une chute des cheveux.

Comment prévenir et gérer la survenue de ces effets indésirables ?

Je prends des précautions pour éviter le syndrome main-pied :

- Quotidiennement, appliquez des **crèmes sans parfum hydratante** pour peaux très sèches sur les zones atteintes.

- J'évite l'exposition des mains et des pieds à la chaleur ou au froid intense.

- Ma tension artérielle sera **suivie régulièrement** pour dépister une **hypertension artérielle**. Si nécessaire, elle sera traitée de façon appropriée. Dans le cas d'une augmentation de la tension artérielle, un traitement anti-hypertenseur pourra m'être prescrit par mon médecin oncologue, mon médecin traitant ou mon cardiologue.

- Ma fonction cardiaque sera suivie régulièrement : En cas de signe d'insuffisance cardiaque : essoufflement, œdèmes, gonflement des jambes ou des chevilles.

- Je surveille ma peau pour repérer l'**apparition de plaques brunes, de verrues...** sur les zones exposées aux UVs.

- **Je me protège du soleil** : j'applique de la crème solaire indice fort, je mets des lunettes de soleil, je porte un chapeau, j'évite les expositions prolongées au soleil.

Pour ces symptômes, une ordonnance de soins de support adaptés vous est remise par votre médecin oncologue. Si vous ressentez des effets non mentionnés, ou si ces effets sont sévères, n'hésitez pas à contacter votre médecin, IDEC ou votre pharmacien.