

Existe-t'il des interactions médicamenteuses avec mon traitement ?

Certains médicaments peuvent augmenter les effets indésirables de votre traitement ou diminuer son efficacité.

 Par conséquent, ne prenez aucun nouveau traitement (même sans ordonnance) sans avis médical.

Parmi les médicaments contre-indiqués, on trouve :

- Les médicaments inducteurs ou inhibiteurs d'une protéine, du cytochrome CYP3A4...
- Les traitements qui modifient le rythme cardiaque
- Les médicaments anti-acides utilisés pour soulager les aigreurs d'estomac (type Gviscon®, Maalox®, Inexium®, Lanzor®) ainsi que ceux contenant du charbon ou de l'argile pour soulager les ballonnements (Smecta®) doivent être pris à distance de votre médicament.
- Les antiagrégants plaquettaires (type aspirine) peuvent augmenter le risque de saignements et doivent être utilisés avec précaution si besoin.

 **Pensez à donner la liste complète des médicaments, plantes ou tisanes à votre médecin ou à votre pharmacien.**

Que faire en cas de déplacement ou de voyage ?

Pensez à prendre avec vous votre traitement en quantité suffisante. Pensez également à prendre votre ordonnance originale pour un éventuel renouvellement. En cas de décalage horaire, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que faire en cas d'intervention chirurgicale ?

Il faut absolument signaler que vous prenez Révuménib Revuforj® avant tout geste chirurgical ou de chirurgie dentaire (même une extraction dentaire).

Recommandations générales



Se laver les mains avant et après chaque manipulation des comprimés.



De préférence, ramenez les boîtes Révuménib Revuforj® entamées à votre pharmacie en fin de traitement.



Protégez-vous du soleil et évitez les expositions prolongées.



Une contraception efficace doit être poursuivie pendant la durée du traitement.



Le médicament doit être conservé dans sa boîte d'origine, à une température ne dépassant pas 25°C, hors de la portée des enfants.

Contactez immédiatement le médecin en cas de :

- Difficultés à respirer ou à avaler
- Signes infectieux ou T° > 38°C
- Taux de plaquettes inférieur à 50 000/mm³ : augmentation du risque de saignements
- Taux de polynucléaires neutrophiles inférieur à 500/mm³ : augmentation du risque d'infection



CENTRE
HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE
BORDEAUX

PÔLE PRODUITS DE SANTÉ
PHARMACIE

Révuménib – REVUFORJ®

Informations à l'attention des patients



PHARMA VILLE HOP

PHARMACIE A USAGE INTERIEUR
CHU de BORDEAUX
Mail : pharmavillehop@chu-bordeaux.fr
Téléphone :

- ☐ Site Haut Lévêque : 05 57 65 64 95
- ☐ Site Saint-André : 05 57 82 25 44
- ☐ Site Pellegrin : 05 56 79 55 03



Votre médecin vous a prescrit Révuménib – REVUFORJ® pour la prise en charge de votre hémopathie

Présentation et conditions de prescription

Le Révuménib se présente sous la forme de comprimés dosés à 25, 110 ou 160 mg pour les adultes et sous forme de sirop [40mg/mL] pour les enfants. Il est prescrit par un médecin hospitalier spécialiste et est disponible uniquement dans certaines pharmacies hospitalières.

Comment agit mon médicament ?

Revuforj® est un traitement ciblé qui permet d'inhiber un signal de survie des cellules tumorales responsables de la leucémie.

Comment dois-je prendre mon médicament ?

Le Revuforj® se prend par voie orale avec un verre d'eau :

- A distance de la prise de nourriture
- En deux prises par jour à heure régulière,

Aucun aliment ne doit être consommé dans les 2h avant ni dans l'heure suivant la prise de Revumenib



Ne jamais arrêter le traitement ou modifier le rythme d'administration sans avis du prescripteur.

Les comprimés ne doivent pas être pris avec **du jus de pamplemousse** ou **d'orange amère** ni avec des produits à base de **Millepertuis**. Ils doivent être avalés entiers et ne doivent être ni écrasés, ni croqués, ni mâchés.

Que dois-je faire en cas d'oubli ou de vomissement ?

Si vous avez oublié une prise, **prenez la dose dès que possible le même jour dans les 4 heures qui suivent la prise habituelle**, avec un retour à l'heure habituelle le jour suivant.

Ne jamais doubler la dose suivante dans le but de rattraper une dose manquée.

En cas de vomissements après la prise, ne reprenez pas la dose du jour et ne doublez pas la dose suivante.

Quels sont les principaux effets indésirables liés à ce traitement ?

Vous ne ressentirez pas forcément ces effets indésirables. En cas de survenue des symptômes suivants, informez votre médecin ou votre infirmière coordinatrice (IDEC).

- Signes d'infection : fièvre, frissons, toux, maux de gorge, brûlures urinaires
- Saignements inhabituels
- Troubles digestifs (diarrhées, constipation, nausées, vomissements)
- Fatigue, vertiges, somnolence
- Crampes/douleurs musculaires
- Modification du bilan biologique : Augmentation des enzymes hépatiques, modification du bilan endocriniens

Ce médicament provoque-t-il une chute des cheveux ?

Ce médicament ne provoque pas de chute des cheveux.

Comment prévenir et gérer la survenue de ces effets indésirables ?

- **Signes d'infection** : en prévention des infections, limitez les contacts avec les personnes infectées/contagieuses. Se laver fréquemment les mains ; désinfectez soigneusement toute plaie. Contactez votre médecin en cas de signes infectieux : fièvre > 38°C, frissons ou sueurs, toux, brûlures urinaires...

Troubles digestifs :

- En cas de diarrhées, évitez café, boissons glacées, lait, fruits et légumes crus, céréales, pain complet et alcool. Buvez si possible 2L par jour (eau, thé, bouillons...).
- En cas de constipation : buvez si possible 2L d'eau par jour. Privilégiez une alimentation riche en fibres (légumes verts, fruits, fruits secs).
- En cas de nausées, vomissements : buvez entre les repas ; évitez les aliments frits, gras, épicés ; mangez lentement, faites plusieurs petits repas.

Crampes/douleurs musculaires : hydratez-vous fréquemment. Limitez, si possible, les gestes répétitifs. Si ces symptômes sont fréquents, parlez-en à votre médecin. Des compléments alimentaires à base de magnésiums peuvent soulager ces symptômes.

- **Palpitations cardiaques** : Contactez votre médecin en cas d'accélération du rythme cardiaque, dyspnée, palpitations, battements de cœur irréguliers.

Si vous ressentez des effets non mentionnés, ou si ces effets sont sévères, n'hésitez pas à contacter votre médecin, IDEC ou votre pharmacien.