

Pour ces symptômes, une ordonnance de soins de support adaptés vous est remise par votre médecin oncologue. Si vous ressentez des effets non mentionnés, ou si ces effets sont sévères, n'hésitez pas à contacter votre médecin, IDEC ou votre pharmacien.

Existe-t'il des interactions médicamenteuses avec mon

Certains médicaments peuvent augmenter les effets indésirables de votre traitement ou diminuer son efficacité.



Par conséquent, ne prenez aucun nouveau traitement (même sans ordonnance) sans avis médical.

Parmi, les médicaments contre-indiqués, on trouve :

- Une surveillance périodique sera effectuée si vous êtes sous anticoagulants en raison du risque hémorragique.
- Les antiagrégants plaquettaires (type aspirine) peuvent augmenter le risque de saignements et doivent être utilisés avec précaution si besoin.
- Les médicaments antiacides utilisés pour soulager les aigreurs d'estomac ainsi que ceux contenant du charbon ou de l'argile pour soulager les ballonnements doivent être pris à distance de votre médicament



Pensez à donner la liste complète des médicaments, plantes ou tisanes à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que faire en cas de déplacement ou de voyage ?

Pensez à prendre avec vous votre traitement en quantité suffisante. Pensez également à prendre votre ordonnance originale pour un éventuel renouvellement. En cas de décalage horaire, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que faire en cas d'intervention chirurgicale ?

Il faut absolument signaler que vous prenez Sorafenib avant tout geste chirurgical ou de chirurgie dentaire.

Recommandations générales



Se laver les mains avant et après chaque manipulation des comprimés.



De préférence, ramenez les boîtes de Sorafenib entamées et les emballages vides à votre pharmacie en fin de traitement.



Protégez-vous du soleil et évitez les expositions prolongées.



Sorafenib est contre-indiqué pendant la grossesse et l'allaitement. Si vous êtes une femme en âge de procréer, utilisez une méthode de contraception efficace pendant et jusqu'à 3 mois après l'arrêt du traitement. Si vous utilisez une méthode de contraception hormonale, ajoutez une méthode de contraception mécanique (préservatif).



Le médicament doit être conservé dans sa boîte d'origine, à une température ne dépassant pas 25°C, hors de la portée des enfants.

Contactez immédiatement le médecin en cas de :

- Difficultés à respirer ou à avaler
- Signes infectieux ou T° > 38°C
- Taux de plaquettes inférieur à 50 000/mm³ : augmentation du risque de saignements
- Taux de polynucléaires neutrophiles inférieur à 500/mm³ : augmentation du risque d'infection



PÔLE PRODUITS DE SANTÉ
PHARMACIE

SORAFENIB – NEXAVAR®

Informations à l'attention des patients



PHARMA VILLE HOP

PHARMACIE A USAGE INTERIEUR
CHU de BORDEAUX

Mail : pharmavillehop@chu-bordeaux.fr

Téléphone :

☐ Site Haut Lévêque : 05 57 65 64 95

☐ Site Saint-André : 05 57 82 25 44

☐ Site Pellegrin : 05 56 79 55 03



Votre médecin vous a prescrit Sorafenib
NEXAVAR® pour la prise en charge de votre
pathologie oncologique

Présentation et conditions de prescription

Sorafenib se présente sous la forme de comprimés dosés à 200 mg. Il est prescrit par un médecin hospitalier spécialiste et est disponible uniquement en pharmacie de ville sur ordonnance. Il est nécessaire d'anticiper le renouvellement des ordonnances plusieurs jours à l'avance.

Comment agit mon médicament ?

Sorafenib est un traitement ciblé qui empêche la tumeur de se créer de nouveaux vaisseaux sanguins et de proliférer.

Comment dois-je prendre mon médicament ?

Sorafenib se prend par voie orale avec un verre d'eau :

- En deux prises par jour à heures régulières
- Sans nourriture, 1 heure avant ou 2 heures après le repas



Ne jamais arrêter le traitement ou modifier le rythme d'administration sans avis du prescripteur.

Les comprimés ne doivent pas être pris avec **du jus de pamplemousse** ou **d'orange amère** ni avec des produits à base de **Millepertuis**. Ils doivent être avalés entiers et ne doivent être ni écrasés, ni croqués, ni mâchés.

Que dois-je faire en cas d'oubli ou de vomissement ?

Si vous avez oublié une prise, **ne prenez pas la dose oubliée**. Ne jamais doubler la dose suivante dans le but de rattraper une dose manquée.

En cas de vomissements après la prise, ne reprenez pas la dose du jour et ne doublez pas la dose suivante.

Quels sont les principaux effets indésirables liés à ce traitement ?

Vous ne ressentirez pas forcément ces effets indésirables. En cas de survenue des symptômes suivants, informez votre médecin ou votre infirmière coordinatrice (IDEC).

■ Troubles gastro-intestinaux : Nausées, vomissements, Diarrhées, Perte d'appétit, du goût, amaigrissement

■ Syndrome mains-pieds : Douleur, rougeur de la plante des mains et de la paume des pieds, Fourmillements, Sècheresse cutanées

■ Plaies douloureuses dans la bouche (aphtes, mucites)

■ Saignements inhabituels (de nez, urines, selles ...)

■ Fatigue, vertiges, maux de tête (signe d'une élévation de la tension artérielle)

■ Infections : Fièvre, frissons, Toux

Vous pourriez peut-être voir sur votre prise de sang :

■ Diminution des polynucléaires neutrophiles (globules blancs), peut être responsable d'infection

■ Diminution des plaquettes, peut être responsable de saignements

■ Diminution des globules rouges (anémie), peut être responsable d'essoufflement, de pâleur, de fatigue.

Liste non exhaustive.

Ce médicament provoque-t-il une chute des cheveux ?

Ce médicament ne provoque pas de chute des cheveux.

Comment prévenir certains effets indésirables ?

- **Eruptions cutanées (syndrome mains-pieds) :** en cas de symptômes, utilisez un savon doux et un agent hydratant et contactez votre médecin. En cas d'exposition solaire, utilisez une protection (écran total) et évitez les expositions prolongées.
- **Aphtes et mucites :** ayez une bonne hygiène bucco-dentaire, brossez-vous les dents avec une brosse à dents souple après chaque repas, suivi de bains de bouche.
- **Augmentation de la tension artérielle :** votre tension artérielle sera suivie régulièrement pour dépister une hypertension artérielle. Si nécessaire, elle sera traitée de façon appropriée. Dans le cas d'une augmentation de la tension artérielle, un traitement anti-hypertenseur pourra vous être par votre oncologue, médecin traitant ou cardiologue.
- **Signes d'infection :** en prévention des infections, limitez les contacts avec les personnes infectées/contagieuses. Se laver fréquemment les mains ; désinfectez soigneusement toute plaie. Contactez votre médecin en cas de signes infectieux : fièvre > 38°C, frissons ou sueurs, toux, brûlures urinaires...
- **Saignements inhabituels :** évitez les anti-inflammatoires (aspirine, ibuprofène), les sports violents, prudence avec les objets coupants (jardinage, cuisine). En cas de saignements buccaux, préférez une brosse à dents souple. Contactez votre médecin en cas de saignements anormaux, apparition de bleus, tâches rouges sur la peau...
- **Troubles digestifs :**
 - En cas de diarrhées, évitez café, boissons glacées, lait, fruits et légumes crus, céréales, pain complet et alcool. Buvez si possible 2L par jour (eau, thé, bouillons...).
 - En cas de nausées, vomissements : buvez entre les repas ; évitez les aliments frits, gras, épicés ; mangez lentement, faites plusieurs petits repas.